

вершине, экзокориум у самки обычно весь светлый, часто и вся переднеспинка светлая.

Izometopus rugiceps Kerzhner, sp. n.; рис. 7—11

Тело овальное, у самки шире, чем у самца, коротко опушено. Голова в верхней половине желтая, со светлой пунктировкой, в нижней половине с 5 поперечными валиками цвета слоновой кости и темно-бурыми или черными бороздами между ними, наличник светлый, очень короткий. Ширина головы в 1,5 раза больше высоты. Глаза темно-бурые. Темя в 1,5 раза уже глаза. Хоботок темно-бурый, доходит до задних тазиков. Усики черные, у самки на вершине 2—4-го члеников желтоватые, иногда у самки буровато-желтая середина 2-го членика, длина члеников начиная с 1-го у самца 0,1 мм; 0,7; 0,13; 0,16, у самки 0,1; 0,7; 0,21; 0,19 мм, 2-й членик у самца толще, чем у самки, волоски на нем у самки прямые, у самца они длиннее и гуще и со слегка загнутыми вершинами.

Переднеспинка пунктированная, черная. Ширина переднеспинки в 2,2—2,6 раза шире длины, передний край у самца прямой, у самки со слегка выдвинутыми вперед углами, боковые края выпуклые, задний выемчатый по бокам от середины. Щиток пунктированный, черный, иногда узкобуроватый или желтоватый на вершине.

Надкрылья черновато-бурые, слегка светлее к наружному краю. Клавус, эндокориум и кунеус пунктированы у обоих полов, экзокориум у самки пунктирован весь, а у самца — только во внутренней половине. Перепоночки серовато-черные, с более темными буро-черными жилками, у самца они обычно почти полные, у самки перекрываются лишь частично.

Низ тела черный. Ноги бурые до черных, вершины всех бедер, вершины передних и средних голеней, основания лапок буро-желтые.

Парамеры — рис. 10, 11.

Длина самца 2,8—3 мм, самки 2,9—3,2; ширина самца 1,5—1,7, самки 1,9—2 мм.

Прим., Хасанский р-н: Рязановка, 10 км северо-восточнее Сухановки, на *Quercus dentata*, 31. VII 1982 (К.), 2 самки; Витязь, 15 км южнее Сухановки, на свет, 2 и 3. VIII 1982 (К.), 2 самца (в том числе голотип, 3. VIII); Андреевка, бухта Троицы, на *Q. dentata* и на свет, 24. VII— 1. VIII 1985 (С.), 3 самца, 1 самка. 3 личинки, вероятно относящиеся к этому виду, собраны в Рязановке 7 и 8. VII 1982 на *Quercus* и *Ulmus*.

От всех восточнопалеарктических видов легко отличается своеобразной скульптурой головы.