

и образует почти треугольный выступ. Усики длинные, 1-й и 4-й членики почти равной длины, 3-й вдвое, а 2-й в 5—6 раз длиннее каждого из них. Хоботковые пластинки короткие. Хоботок доходит до середины среднегруди.

Переднеспинка почти вдвое шире длины, задний край ее выпуклый, мозолистые возвышения полностью разделены треугольным участком между ними, бугровидно выступают наружу, задняя доля с неясственной скульптурой. Щиток умеренно выпуклый, с продольной ложбинкой посередине, без выростов. Надкрылья полные, далеко заходят за вершину брюшка, с 2 рядами точек (вдоль наружного края клавуса и вдоль границы эмболиума и кориума), на кориуме неясственно просматриваются 2 жилки, из них наружная в вершинной трети с 2 группами густых черных щетинок, дистальная из этих групп больше по площади и находится на слегка повышающемся к середине участке. Эмболиум уже толщины 1-го членика усиков. Кунеус вдвое длиннее ширины. Перепоночка с 1 ячейкой, задний внутренний угол которой сильно оттянут назад. Поверхность надкрылий, в том числе перепоночки, с круглыми светлыми пятнами на темном фоне.

Ноги длинные. Бедра не утолщены, слегка узловатые на вершине. Лапки 3-члениковые, очень слабо утолщены к вершине, со следами исходного разделения на 2 членика, особенно на задних ногах. Коготки изогнуты под прямым углом, с большими псевдопальцами.

Брюшко расширено к середине и у самки нередко выступает за боковой край надкрылий. Гениталии самца как на рис. 17—22.

Типовой вид *Dimia inexpectata* sp. n.

Новый род — первый представитель трибы в фауне Палеарктики. Наиболее близок к нему род *Pachypeltis* Signoret, 1958 (Ориентальная область), который отличается тем, что у него глаза голые, окаймление усиковых ямок одинаково невысокое со всех сторон, мозолистые возвышения (рис. 13) снаружи округлены и не выступают, задний край переднеспинки посередине прямой или слабовогнутый, опушение надкрылий однотипное и одноцветное; они без круглых светлых пятен, кориум без жилок и без групп густых щетинок, тело уже (в 4—5 раз длиннее ширины).

Род назван именем Д. Р. Каспаряна, который первым его собрал.

*Dimia inexpectata* Kerzhner, sp. n.; рис. 12, 14—22

Общая окраска верхней стороны светло- и темно-бурая, с желтоватыми участками и нередко с расплывчатыми красными пятнами.

Голова желтая, большое пятно, занимающее значительную часть верхней стороны головы, пятно в основании наличника и (обычно) полоса между нижним краем глаза и задним краем головы темно-бурые; имеются также небольшие красные пятна.