

но равной длины, 2-й приблизительно вдвое длиннее 3-го и 4-го, вместе взятых.

Переднеспинка трапециевидная, сзади втрое шире, чем впереди, боковые края ее прямые, задний слегка вогнут. Шейное кольцо умеренной ширины, плоское. Мозолистые возвышения плоские, широко разделены. Прочие части переднеспинки равномерно пунктированы. Щиток широкий, треугольный, в едва заметных поперечных морщинках.

Надкрылья полные, с умеренно выпуклым боковым краем, далеко заходят за вершину брюшка. Клавус и кориум равномерно и явственно пунктированы, эмболиум и кунеус без пунктирки. Кориум без жилок. Эмболиум слегка шире толщины задней голени. Кунеус треугольный, слегка длиннее ширины, вырезка на наружном крае надкрылья между кунеусом и кориумом едва намечена. Перепоночка с 2 ячейками, внутренний угол большой ячейки округлен.

Ноги умеренной длины, бедра не утолщены, задние голени слегка изогнуты. Лапки 3-члениковые, слегка утолщены к вершине. Коготки сильно изогнуты, с большими округлыми пульвилами, без зубчиков (*pulvillar combs*).

Гениталии самца — рис. 29—35.

Типовой вид *Sinevia tricolor* sp. n.

Близок к африканскому роду *Bunsua Carvalho*, 1951, но у последнего боковой край переднеспинки с шипиками, хоботок доходит до средних тазиков.

Род назван в честь сборщика — С. Ю. Синева.

Sinevia tricolor Kerzhner, sp. n.; рис. 23—35

Тело слегка более чем вдвое длиннее ширины, блестящее, опущено светлыми волосками.

Голова желтая, в нижней половине и по заднему краю темени хотя бы отчасти оранжевая, у самца с черноватым пятном над основанием наличника. Темя у самца в 1,6, у самки в 1,9 раза шире глаза. Хоботок желтый, узкобуроватый на вершине. Усики желтые, вершинная 1/7—1/9 2-го членика, 3-й и 4-й членики черные. Опушение усиkov светлое, на 3-м и 4-м члениках слегка длиннее, чем на 1-м и 2-м. Длина члеников усиkov начиная с 1-го у самца 0,35 мм; 1,60; 0,37; 0,37, у самки 0,35; 1,40; 0,42; 0,40 мм.

Переднеспинка у самки песочно-желтая, с бурыми мозолистыми возвышениями, боковыми краями и пятнышком посередине заднего края, у самца буро-черная, с песочно-желтым шейным кольцом и пятном посередине кзади от мозолистых возвышений, задняя доля, кроме боковых краев, буроватая. Длина переднеспинки 0,85 мм, ширина у самца 1,5, у самки 1,6 мм. Щиток песочно-желтый, у самки с очень маленьким, у самца с большим треугольным бурым пятном у середины переднего края.