

как у *L. hoherlandti*, без складки для вкладывания спикулы.

Длина 5,3, ширина 2,2 мм.

Прим., Хасанский р-н: Витязь, 15 км южнее Сухановки, на свет. 8.VIII 1982 (К.), 1 самец (голотип).

У ближайшего к новому вида *L. hoherlandti* Kulik чувствительный бугорок левого парамера на вершине округлен, гипофиз правого парамера слегка длиннее, надкрылья без темных пятен.

*Lygocoris (Neolygus) philyrinus* Kerzhner, sp. n.;  
рис. 56—58, 67

Светло-зеленый. Голова, переднеспинка, щиток и низ тела без темных пятен. 2-й членик усиков весь светлый, 3-й и 4-й бурые. Кориум у самца обычно с бурой полосой по заднему краю в его внутренней половине, у самки она отсутствует или едва намечена. У голотипа слегка затемнен (оливково-зеленый) клавус. Перепоночка светло-серая, практически одноцветная, с желтоватыми жилками. Задние бедра с немногими маленькими бурыми пятнышками, буроватые перевязи у их вершины едва намечены. Голени с бурыми щетинками, выходящими из бурых пятнышек. 3-й членик лапок от целиком светлого до целиком буроватого. Низ тела весь светлый.

Ширина головы у самца 1,01—1,06 мм, у самки 1,08—1,11, темя по заднему краю с килем, ширина темени у самца 0,33—0,34, у самки 0,40—0,43 мм, темя у самца едва заметно уже, у самки в 1,17—1,25 раза шире глаза. Хоботок доходит до вершины средних тазиков. Длина члеников усиков начиная с 1-го у самца 0,71 мм; 2,14—2,31; 1,14—1,29; 0,71—0,79, у самки 0,69—0,71; 2,19—2,31; 1,21—1,33; 0,74—0,81 мм. Длина переднеспинки у самца 0,94—0,99 мм, у самки 1,03—1,14, ее ширина у самца 1,69—1,76, у самки 1,80—1,99 мм, отношение ширины к длине у самца 1,78—1,80, у самки 1,67—1,83. Задняя доля переднеспинки, клавус и кориум в очень слабой пунктиривке.

Парамеры — рис. 57, 58. Спикула эдеагуса (рис. 67) тонкая, лишь в 1,1—1,2 раза короче ширины головы самца, на вершине острия и умеренно изогнута, лопасть эдеагуса с очень коротким вершинным выростом.

Длина самца 5,5—5,7 мм, самки 5,6—6,2, ширина самца 2,1—2,2, самки 2,3—2,5 мм.

Прим., Хасанский р-н: Рязановка, 10 км северо-восточнее Сухановки, 8—9.VII 1982 (К.), 2 самца (в том числе голотип, 8.VIII), 5 самок; заповедник «Кедровая Падь», 23.VII—13.VIII 1982 (К.), 1 самец, 2 самки; Витязь, 15 км южнее Сухановки, 4.VIII 1982 (К.), 1 самка.

Живет на липе (*Tilia amurensis*), летит на свет.

Близок по внешности и строению гениталий к *L. nemoralis* Kulik, но у последнего зеленая окраска тела и серая окраска перепоночки в среднем темнее, перепоночка с явственным рисунком.