

ком, спикнула эдеагуса в 1,7—1,9 раза короче ширины головы самца, лопасть эдеагуса с более длинным вершинным выростом.

*Lygocoris (Neolygus) aceris* Kerzhner, sp. n.; рис. 59—61, 68

Зеленый. Голова, переднеспинка, щиток и низ тела без темных пятен. 2-й членик усиков весь светлый, 3-й и 4-й бурые (3-й иногда буровато-зеленый). Клавус с темно-бурой полосой по внутреннему краю, кориум с темно-бурым пятном во внутреннем заднем углу. Перепоночка серая, с желтоватыми жилками и хорошо заметными темными пятнами у заднего края ячеек, между ячейками и вершиной кунеуса, а также в задней четверти перепоночки. Темные пятнышки на заднем крае задних бедер отсутствуют. Близ вершины задних бедер снизу и сверху 2 едва различимые бледно-бурые перевязи. Голени с бурыми щетинками, бурые пятнышки при основании щетинок очень маленькие или отсутствуют. 3-й членик лапок в вершинной половине бурый.

Ширина головы самца 1,09—1,13 мм, самки 1,14, ширина темени у самца 0,34—0,39, у самки 0,39 мм, темя по заднему краю с килем, у самца и самки приблизительно равно по ширине глазу. Хоботок доходит до задних тазиков. Длина члеников усиков начиная с 1-го у самца 0,64—0,67 мм, 2,10—2,21, 1,10—1,21, 0,61—0,66, у самки 0,67, 2,21, 1,21, 0,64 мм. Длина переднеспинки у самца 1,14—1,19 мм, у самки 1,23, ширина у самца 2,00—2,7, у самки 2,24 мм, отношение ширины к длине у самца 1,73—1,79, у самки 1,82. Задняя доля переднеспинки, клавус и кориум в очень слабой пунктировке.

Параметры — рис. 60, 61. Эдеагус (рис. 68) с 2 изогнутыми спикулами, из которых одна образована сильно склеротизованной лопастью.

Длина самца 5,8—6,0 мм, самки 6,1; ширина самца 2,3—2,5, самки 2,6 мм.

Прим., Хасанский р-н, Андреевка, 10 км южнее Сухановки, на клене приречном (*Acer ginnala*), 10.VII 1982 (К.), 4 самца (в том числе голотип), 1 самка.

Наличием двух, а не одной спикул в эдеагусе хорошо отличается от всех палеарктических видов подрода.

*Lygocoris (Neolygus) fraxini* Kerzhner, sp. n.; рис. 62—64, 69.

Светло-зеленый или желтовато-зеленый, голова и переднеспинка (кроме ее боковых краев и середины), как правило, бледно-оранжево-желтые. Наличник в вершинной трети черный, остальная часть его, а также щеки у самца всегда, у самки иногда с оранжевыми расплывчатыми пятнами. 2-й членик усиков весь светлый, 3-й и 4-й бурые. Щиток весь светлый. Кориум с бурой полосой во внутренней 1/2—2/3 заднего края. Клавус у самца иногда слегка буроватый вдоль внутреннего края. Перепоночка темно-серая, с желтоватыми жилками, задняя часть ячеек, пятно между ячейками и вершиной кунеуса и задняя