

Новый вид, кроме самых светлых особей, отличается от широко распространенных *L. spinolae* M.-D. (полифаг на кустарниках и высокотравье) и *L. lucorum* M.-D. (олигофаг *Artemisia* spp.) буроватой полосой или еще более развитым затемнением клавуса, а также крупным темным пятном на вершине кунеуса; темные особи *L. nigrovirens* отличаются еще темным рисунком на переднеспинке и щитке, а также более сильным затемнением кориума. У *L. nigronasutus* Stål (Алтай, Иркутская обл., Монголия, Сычуань; возможно, на *Urtica sappabina*) наружный край кориума всегда узкочерный, и это обычно видно даже сверху, наличник весь или почти весь черный, а иногда еще и лоб с черной полоской, переднеспинка и щиток без темных пятен, темная полоса вдоль внутреннего края клавуса имеется лишь у темных самцов, кориум затемнен только во внутреннем или в обоих задних углах или во всей задней части, но не более чем до середины общего шва, 3-й членик лапок весь черный. Указания *L. nigronasutus* с Сахалина и Курильских островов [Кержнер, 1978] относятся, за исключением единичных особей, к *L. nigrovirens*, а из других районов Дальнего Востока — преимущественно к *L. lucorum*. Наконец, *L. malaisei* Lindb. (эндемик Камчатки, на *Artemisia vulgaris*), как правило, темнее *L. nigrovirens* (хотя светлые экстремы первого и темные экстремы второго близки по окраске), у него лоб всегда с черной или бурой полосой, обычно затемнены щеки и уздечки, а кунеус беловато-зеленый и очень узко затемнен на вершине.

Гениталии самцов у всех видов этой группы устроены сходно и для отыскания в них видовых различий требуется дальнейшее исследование.

Lygocoris (Apolygus) subpulchellus Kержнер, sp. n.; рис. 81—83

Вид из группы *L. adustus* Jak., очень изменчив по окраске, самцы в среднем темнее самок.

Голова желтая; наличник весь черный, у темных самцов обычно лоб, щеки и уздечки с бурым рисунком и киль на темени бурый; нередко на голове, особенно в ее нижней части, имеются оранжевые пятна. 1-й членик усиков желтый, 2-й желтый, с черной вершиной, иногда черная часть занимает больше половины его длины, но основание его почти всегда светлое. 3-й и 4-й членики черные, с узкобеловатым основанием. Переднеспинка у светлых особей вся желтая или только мозолистые возвышения бурые или черные, у темных особей темно-бурые или черные мозолистые возвышения, боковые и задний края (кроме узкого окаймления заднего края). Щиток желтый, у темных особей с 2 темными пятнами в основании, или с выемчатым на вершине пятном, или весь черный, кроме вершины. Клавус весь желтый, или затемнен в средней части или по внутреннему краю, или весь черный. Кориум у светлых особей желтый, с черным или темно-бурым задним краем и (см. сбоку) с черной линией по