

Указание *L. pulchellus* из Японии [Linnavuori, 1961, 1963], вероятно, относится к *L. subpulchellus*.

Кроме *L. subpulchellus*, на *Lespedeza bicolor* живет еще *L. hilaris* Ногү. У него размеры в среднем больше (длина самца 4,5—4,9 мм, самки 5—5,3 мм), задние (и другие) бедра оранжево-желтые целиком или в основании и на вершине, 2-й членик усиков либо весь черный, либо зачернен в основании (узко) и на вершине (более широко), наличник в большей части светлый, у темных самцов буровато-черные вершинная 1/2 корнуса (по внутреннему краю больше), до 3/4 вершинной части клавиша и иногда щиток (у светлых особей окраска надкрылий и щитка как у светлых особей *L. subpulchellus*).

*Lugocoris (Apolygus) syringae* Kerzhner, sp. n.; рис. 87

Вид из группы *L. adustus* Jak.

Голова и переднеспинка оранжево-желтые, наличник весь или почти весь черный, нижняя часть головы иногда с красными пятнами. 1-й членик усиков весь желтый или снизу зачернен на вершине или целиком, иногда весь черный, 2-й членик весь черный (кроме самого основания) или черный приблизительно в вершинной половине и в базальной четверти (реже базальное темное кольцо более узкое и бурое), 3-й и 4-й членики (кроме самого основания) черные. Переднеспинка без темных пятен. Щиток либо темно-бурый или черный с узкожелтой вершиной, либо весь буровато- или оранжево-желтый. Надкрылья оранжево-желтые, клавишус весь светлый или затемнен в вершинной половине по внутреннему краю или весь, кроме базальной половины наружного края, темно-бурый или черный. Корнум по заднему краю темно-бурый или черный, эта темная полоса занимает от 1/4 до 2/5 его длины, обычно она слегка расширяется кнаружи. Основание кунеуса все или во внутренней части и вершина кунеуса темно-бурые или черные, светлая часть его отчасти, реже целиком, оранжевая или красная. Перепоночка окрашена, как у *L. subpulchellus*. Тазики желтые. Бедра желтые, обычно с более или менее развитыми красными участками. Задние бедра могут быть целиком желтыми, или целиком красными, или с расплывчатыми красными участками в срединной части, но во всяком случае не с резким контрастным разделением на красную апикальную и желтую базальную половины (как у *L. subpulchellus*). Вершина задних бедер сверху и снизу с 2 бурыми, реже темно-красными, перевязями. Голени желтые, с черными щетинками, выходящими из бурых пятнышек, колено с черным или бурым пятном (на задних голених иногда с 2 пятнами). Лапки желтые, 3-й членик бурый. Низ груди оранжево-желтый или желтый, площадка пахучих желез беловато-желтая. Низ брюшка черный, с желтыми или красными 2-м и вершинными (у самца генитальным) сегментами, редко все брюшко желтое снизу.