



Рис. 89—94. *Lygocoris glaber* sp. n. 89, 90 — правый парамер и его вершина сбоку; 91, 92 — левый парамер и его вершина сверху; 93 — тека; 94 — расправленный эдеагус

сзади или в большей части буро-черная, светлое пятно на кориуме беловато-желтое и не доходит до его наружного края (иногда кориум весь черный). У *L. infamis* Kerzh. нередко сходно с *L. fraxinicola* окрашен 2-й членик усиков, но передне-спинка целиком черная.

*Lygocoris (Arbolygus) glaber* Kerzhner, sp. n.; рис. 89—94

Верх тела кажется голым, лишь при большом увеличении видны на переднеспинке, щитке и надкрыльях чрезвычайно короткие волоски, длина которых много меньше расстояния между их основаниями.

Основная окраска верхней стороны черная. Голова грязно-буровато-желтая, иногда вершина наличника и уздечки черные, лоб с расплывчатым более светлым рисунком в виде расходящихся от середины косых полосок. Усики черные, 1-й членик и базальная треть 2-го нередко светлее, до грязно-желтых, 3-й и 4-й в основании узкобелые. Переднеспинка черная, шейное кольцо желтое, позади него иногда 2 маленьких желтых пятнышка, задний край по всей длине или по краям узко окаймлен белым. Щиток черный, с узкобелой вершиной. Надкрылья черные или буровато-черные, жилки в самом основании кориума, граница кориума и кунеуса, маленькое пятнышко на вершине кунеуса беловатые, перепоночка темно-серая, светлее в передних