

2/3 ячеек и местами позади них, жилки светлые, кроме большей части жилки, окаймляющей большую ячейку. Низ груди и брюшка от желтовато-бурового до почти черного, окраска неравномерная, но брюшко самки без выделяющегося светлого пятна посередине. Ноги беловатые или грязно-желтые. Задние бедра с 2 бурыми или черными кольцами в вершинной половине, менее четкие темные кольца иногда имеются на средних бедрах, очень редко — на передних. Все голени темно-бурые или черные в базальных 3/4 и на вершине, щетинки на них бурые. Лапки бурые, 1-й и 2-й членник часто, особенно на задних лапках, желтоватые.

Темя и верхняя половина лба обычно с явственной продольной бороздкой, задний край темени без киля или с едва намеченным.

Ширина головы у самца 1,17—1,22 мм, у самки 1,20—1,30, ширина темени у самца 0,37—0,40, у самки 0,42—0,45, длина членников усиков начиная с 1-го 0,80—0,90; 1,90—2,25; 1,00—1,07, 0,50—0,62; длина переднеспинки у самца 1,42—1,55, у самки 1,55—1,75, ее ширина у самца 2,30—2,40, у самки 2,47—2,75 мм.

Гениталии самца — рис. 89—94.

Длина самца 6,8—7,5 мм, самки 7,1—8,2; ширина самца 2,7—3,0, самки 3,1—3,4 мм.

Прим., Хасанский район: Рязановка, 10 км северо-восточнее Сухановки, 7.VII 1982 (К.), 1 самец; Витязь, 15 км южнее Сухановки, 12.VII—21.VIII 1982 (К.), 38 самцов (в том числе голотип, 12.VII), 11 самок; Андреевка, 24.VII 1985 (С.), 1 самец. Япония, Хонсю: Kunitachi, 30 km of Tokyo, 17.VII 1936, 9.VIII 1937 (Женежуррист), 2 самки.

Живет на дубе зубчатом (*Quercus dentata*), летит на свет.

Легко отличается от всех видов подрода крайне коротким опушением всей верхней стороны тела и строением гениталий. По окраске наиболее похож на *L. rubripes* Jak. и *L. ulmi* Kerzh., но у них размеры в среднем крупнее, голени целиком светлые или с 1—3 темными кольцами, занимающими не более половины их длины, щиток обычно с белым пятнышком в каждом углу, а не только в заднем. У *L. rubripes* Jak. на переднеспинке и надкрыльях одинаково длинные и почти одинаково густые волоски, у *L. ulmi* волоски на переднеспинке значительно короче и реже, чем на надкрыльях. В окрестностях Витязя *L. rubripes* найден преимущественно на *Quercus mongolica*.

*Pinalitus nigriceps* Kerzhner, sp. n.; рис. 102—107

Тело у самца в 2,6—2,7, у самки в 2,4—2,5 раза длиннее ширины, блестящее, опушено прилегающими светлыми волосками, более густыми на надкрыльях, переднеспинка (кроме шейного кольца и заднего края) в густой пунктировке, поверхность кориума и клавуса шагренирована.

Голова черная. Усики желтые, 3-й и 4-й членники иногда буроватые. Переднеспинка черная, узкая полоса по ее заднему