

краю белая, шейное кольцо желтое. Щиток и надкрылья красновато-бурые или бурые, вершина щитка белая, вершина кунеуса темно-бурая, перепоночка темно-серая, с желтоватыми жилками. У самца щиток обычно темнее надкрылий. Низ переднегруди и эпистерны среднегруди черные, эпимеры среднегруди и низ заднегруди бурые или черные, края тазиковых покрывшек, ксифус переднегруди и задняя половина площадки пахучих желез белые. Ноги желтые, задние, а иногда и остальные бедра в расплывчатых светло-красных пятнах, 3-й членик лапок в вершинной половине бурый, щетинки на голених бурые. Низ брюшка желтый, боковые края и вершина его красные, у самца генитальный сегмент, а иногда и края брюшка бурые.

Ширина головы у самца 0,93—1,00 мм, у самки 1,03—1,06, ширина темени у самца 0,30—0,31, у самки 0,36—0,39 мм, темя у самца слегка уже, у самки слегка шире глаза, задний край темени с килем. Длина члеников усиков начиная с 1-го 0,46—0,54 мм; 1,65—1,85; 0,93—1,00; 0,53—0,57 мм. Хоботок доходит до задних тазиков, иногда слегка заходит за них. Длина переднеспинки у самца 0,74—0,77 мм, у самки 0,81—0,91, ее ширина у самца 1,29—1,37, у самки 1,43—1,63 мм.

Гениталии самца — рис. 102—107.

Длина самца 4,1—4,6 мм, самки 4,5—5,3; ширина самца 1,6—1,7, самки 1,8—2,1 мм.

Прим.: Витязь, 15 км южнее Сухановки, Хасанский р-н, 12.VII—17.VIII 1982 (К.), 23 самца (в том числе голотип, 12.VII), 18 самок; Горнотаежная станция близ Уссурийска, дендрарий, 3.VII 1985 (С.), 1 самец, 1 самка.

Живет на сосне густоцветковой (*Pinus densiflora*), летит на свет.

Новый вид близок к *P. rubricatus* Fall. и *P. rubeolus* Kulik, но у них голова и переднеспинка красные или хотя бы с красноватым оттенком, а если черные (у части самцов *P. rubricatus*), то основание кунеуса светлее кориума. По строению гениталий самец *P. nigriceps* явно ближе к *P. rubeolus* (рис. 98—101), чем к *P. rubricatus* (рис. 95—97).

Creontiades vitreus Kerzhner, sp. n.; рис. 108—110

Тело сверху блестящее, надкрылья покрыты короткими редкими светлыми прилегающими волосками.

У самца голова, переднеспинка и щиток черные, иногда задний край переднеспинки желтоватый, редко голова и шейное кольцо темно-бурые.

У самки голова грязно-бурая, темнее в нижней половине, переднеспинка грязно-бурая с черными мозолистыми возвышениями или почти вся черная, но всегда с желтыми шейным кольцом и задним краем, щиток черный. Надкрылья беловатые, полупрозрачные, общий шов надкрылий, вершина клавуса и задний край кориума черные, наружный край кориума узкокрасный