

основание кунеуса, более яркие темные кольца на голених, темя уже, параметры значительно меньше (хотя размеры тела у нового вида не намного меньше, чем у *Ph. intricatus*), вершина правого параметра слегка загнута (а не вытянута прямо), перерыв между зубцами гребенки эдеагуса больше.

Вид назван в честь известного исследователя насекомых Дальнего Востока В. В. Шаблиовского.

Т р и б а *Stenodemini*

*Teratocoris ussuriensis* Kerzhner, sp. n.; рис. 125—132

По окраске, форме тела, коротким ногам, очень короткому едва различимому опушению 1-го членика усиков и голеней, отсутствию выроста над параметром на генитальном сегменте самца сходен с *T. antennatus* Boh., распространенным от Западной Европы до Якутии и Забайкалья, отличается признаками, указанными ниже в определительной таблице.

1(2). Темя в 2,0—2,4 раза шире глаза. У самца с развитым темным рисунком (светлые особи неизвестны) мозолистые




Рис. 125—141. *Teratocoris*. 125—132 — *T. ussuriensis* sp. n.: 125, 126 — изменчивость окраски самца, 127—130 — то же самки, 131, 132 — правый и левый параметры светлого самца из Хасана; 133—141 — *T. antennatus* Boh.: 133—135 — изменчивость окраски самца, 136—139 — то же самки, 140, 141 — правый и левый параметры темного самца из окр. Жана-Арки