

- sus*). Возможно, лишь обособленный подвид предыдущего *L. bami* Kulik
- 8(5). Волоски на задних голених хорошо отличаются от щетинок. Щиток весь черный. Окраска надкрылий как на рис. 160—162. Правый параметер на вершине округлен (рис. 163), левый толще и с коротким чувствительным бугорком (рис. 164). Интэррамальный мост капюлятивной сумки самки в виде 2 отдельных склеритов. Длина самца 4—4,5 мм, самки 3,5—4 мм.— Низовья Амура
..... *L. nivchorum* sp. n.

Указания *L. setosus* для «Хабаровского и Приморского краев» в работах С. А. Кулика [1965, 1974] относятся к *L. nivchorum*, причем все материалы в действительности происходили из Хабаровского края, а указание для Приморского края основано на экземпляре с этикеткой «Приморская обл» (территория, включавшая часть Хабаровского края).

Подсем. *Orthotylinae*

Cyllecoris vicarius Kerzhner, sp. n.; рис. 169—174.

C. histrionicus (non Linnaeus, 1767): Miyamoto, 1969a: 83

От *C. histrionicus* (Linnaeus, 1767), распространенного в Европе и на Кавказе, отличается тем, что темный рисунок на корнуме и клавусе черноватый, а не кирпично-красный, опушение слегка короче, основная лопасть правого параметера крупнее и образует с зазубренным отростком меньший угол, этот зазубренный отросток обычно с дополнительным боковым выростом и без зубчиков на внутренней стороне; в эдеагусе спикула А без зубцов и не доходит до его вершины, а спикула Е менее изогнута и доходит до его вершины.

Амур: Симоново, 75 км западнее Свободного, 8 и 14.VI 1959 (К.), 2 самца, 2 самки; Климоуцы, междуречье Малой Перы и Большой Эргели, 10—30.VI 1957 (Г. Зиновьев), 1 самец, 4 самки. Прим. Уссурийск, 4.VII 1959 (Фалькович), 1 самец (голотип); Ясная, Сихотэ-Алинский заповедник, 17.VI 1967 (Ануфриев), 1 самка. Этот же вид, судя по описанию [Miyamoto, 1969a], распространен и в Японии.

Живет, по-видимому, на дубе монгольском (*Quercus mongolica*).

Cyllecoris opacicollis Kerzhner, sp. n.; рис. 175—178

Верх тела голый, надкрылья в едва различимых при большом увеличении волосках, голова сильно блестящая, шейное кольцо и передняя доля переднеспинки матовые, задняя доля, щиток и надкрылья со слабым маслянистым блеском.

Голова черная, с поперечно-овальным желтым пятном на темени. Усики черные, 1-й членик и базальная половина 2-го красновато-бурые, основание 1-го узкожелтоватое. Хоботок жел-