

отличается сильно выступающим в основании наличником, серебристыми чешуйками и черными волосками на верхней стороне тела (у других родов чешуек нет, а все волоски белые, лишь у *Reuteria* на вершине клавуса и отчасти на кунеусе они черные). Своеобразна также окраска усиков и ног, у остальных родов 1-й членик усиков лишь с одной П- или Г-образной темной полосой или только с небольшим пятнышком, 2-й членик (кроме *Reuteria*) без черного кольца в основании, 3-й и 4-й целиком светлые, ноги без темного рисунка (кроме *Reuteria*, у которых колени с черным пятном и иногда едва намечена темная полоса по переднему краю бедер). Имеются и другие отличия от близких родов. Так, у *Brachynotocoris* хоботок едва заходит за передние тазики и глаза прижаты к заднему краю головы, у *Malacocoris* и *Zanchius* глаза сильнее отстоят от заднего края головы, темя у всех родов (кроме некоторых видов *Zanchius*) без кия, у *Reuteria* генитальный сегмент без треугольного выступа снизу. По строению параметров и эдеагуса, очень разнообразных в этой группе. *Ulmica* также не может быть бесспорно сближен ни с одним из известных родов. По окраске ног и усиков *Ulmica* ближе к *Reuteria*, чем к другим родам.

В роде 1 вид — *U. baicalica* (Kulik, 1965), comb. n. Он описан из Забайкалья (Улан-Удэ), найден также в Амурской обл. (Благовещенск), Восточной Монголии и Северо-Восточном Китае (Харбин), живет на вязе приземистом (*Ulmus pumila*).

*Zanchius tarasovi* Kerzhner, sp. n.; рис. 201—205

Светло-зеленый, голова, передняя часть переднеспинки или вся она, кроме задних углов, щиток, клавус вдоль шва, пятно на кориуме в его внутреннем углу, усики, ноги и низ тела желтовато-зеленые или светло-желтые. 1-й членик усиков снизу с Г-образным красным пятном, 2-й обычно с отдельными красноватыми пятнами или даже весь, кроме основания, красноватый. Бока головы за глазами часто с красной полосой. Иногда имеется по красному пятну в основании щитка, на вершине клавуса и во внутреннем углу кориума. Перепоночка светло-серая, позади ячеек с более темным пятном, жилки бледно-зеленоватые. 3-й членик лапок на вершине слегка буроватый.

Верх тела в светлых полуприподнятых волосках, усики в очень коротких прижатых волосках (на 1-м членике также несколько торчащих щетинок), щетинки на голених светлые, длин: : толщины голеней.

Глова поперечная, наличник (см. сверху) слабо выступающий. Глаза приближены к переднему краю головы, а от заднего отстоят более чем на 1/4 своей длины. Середина лба с едва намеченным продольным понижением, задний край темени приподнят в виде кия. Ширина головы 0,77—0,81 мм, ширина темени у самца 0,31—0,34, у самки 0,39 мм, темя у самца в 1,35—1,6,