

у самки в 1,8—2 раза шире глаза. Длина члеников усиков начиная с 1-го 0,5 мм; 1,8—2,1; 1,1—1,2; 0,7 мм. Хоботок доходит до переднего края средних тазиков. Длина переднеспинки 0,55—0,68 мм, ширина 1,1—1,3 мм. Надкрылья далеко заходят за вершину брюшка, длина кориума (2,3—2,7 мм) слегка меньше длины задней голени (2,5—2,9 мм). Задняя голень с 3 полными рядами мельчайших бурых шипиков.

Гениталии самца — рис. 201—205.

Длина самца 4,5—5,1 мм, самки 4,9—5,5; ширина самца 1,6, самки 1,8—2,0 мм.

Прим.: Киевка, Лазовский р-н, 24.VIII 1959 (К.), 1 самец (голотип); заповедник «Кедровая Падь», 24—28.VII, 12.VIII 1982 (К.), 2 самца, 7 самок, 3 личинки; Рязановка, 10 км северо-восточнее Сухановки, 30—31.VII 1982 (К.), 20 самцов, 5 самок; Витязь, 15 км южнее Сухановки, 16—20.VIII 1982 (К.), 3 самца, 4 самки; Андреевка, 10 км южнее Сухановки, 15—18.VIII 1985 (С.), 1 самец, 1 самка.

В Киевке и «Кедровой Пади» собран на орехе маньчжурском (*Juglans mandshurica*), в Рязановке и Витязе — на дубе зубчатом (*Quercus dentata*). Летит на свет.

Род *Zanchius* Dist. распространен в основном в Ориентальной области. В Палеарктике было найдено 3 вида — *Z. alatanus* Nov. (Турция), *Z. breviceps* E. Wagn. (Северо-Восточная Африка, Аравия) и *Z. stami* Doesb. (Сирия). Все они мельче нового вида и с иным строением гениталий. Описанный из Китая (о-в Тайвань) *Z. apicalis* Poppr., судя по описанию, мельче (длина 4 мм), с относительно более длинной переднеспинкой (длина на 1/3 меньше ширины), иным соотношением длины члеников усиков (2-й в 3 раза длиннее 1-го) и т. д.

Новый вид назван в честь Г. А. Тарасова, заведующего редакцией зоологической и физиологической литературы Ленинградского отделения издательства «Наука».

*Orthotylus (Labopidea) bermani* Kerzhner, sp. n.; рис. 206—209

Самцы полнокрылые, удлинённые, самки короткокрылые, с телом, расширенным к середине брюшка. Верх тела в коротких толстых черных волосках (длина волосков около 0,05 мм, на боковом крае основания кориума у самца — до 0,1 мм). Усики и ноги в очень коротких прижатых черных волосках, на голенях тонкие черные щетинки, длина которых приблизительно равна толщине голеней.

Верх у самца темно-оливково-зеленый, верхняя половина головы и мозолистые возвышения переднеспинки иногда темно-бурые, реже почти вся переднеспинка и большая часть щитка буроватые; усики от грязно-зеленых до бурых, ноги обычно слегка темнее надкрылий, 3-й членик лапок и вершина хоботка темно-бурые, перепоночка темно-серая, с грязно-зеленоватыми жилками, низ тела светлый, зеленый, грудь часто зеленовато-