

У *P. okamotoi* Miy. et Lee темя у самца почти вдвое, а у самки более чем вдвое шире глаза, 2-й членик усиков почти равной толщины на всем протяжении, всего вдвое длиннее 3-го, который чаще черный до середины, 4-й членик усиков весь черный, серебристые полосы на надкрыльях шире, размеры меньше (3,5—4,2 мм).

Т р и б а Phylini

Phylus nigriscapus Kerzhner, sp. n.; рис. 219—224

Тело удлиненное, сильно блестящее, покрыто сверху золотистыми полуприлегающими волосками. 1-й и 2-й членики усиков черные, с желтоватым сочленением, 3-й и 4-й желтые. Хоботок желтый, основание или весь 1-й и вершина 4-го членика буроватые. Перепоночка серовато-черная, более светлая между малой ячейкой и вершиной кунеуса. Ноги, включая тазики, светло-желтые.

Ширина головы 0,86—0,90 мм, ширина темени у самца 0,40, у самки 0,45 мм, темя с невысоким килем по заднему краю, у самца в 1,65—1,75, у самки в 2—2,1 раза шире глаза. Длина члеников усиков начиная с 1-го 0,35; 1,6—1,7; 0,75—0,85; 0,35—0,45 мм. 2-й членик у самца почти одинаково толстый (0,07 мм) на всем протяжении, у самки он постепенно утолщается от основания (0,05 мм) к вершине (0,07 мм). Хоботок доходит до середины средних тазиков. Переднеспинка трапецевидная, ее длина у самца 0,77—0,80 мм, у самки 0,76—0,86, ширина у самца 1,3—1,4, у самки 1,4—1,6 мм, отношение ширины к длине у самца около 1,7, у самки около 1,8. Длина задней голени у самца 2,4—2,6 мм, у самки 2,5—2,7 мм.

Генитальный сегмент самца с продольным пластинчатым килем в вершинной половине. Парамеры и эдеагус — рис. 219—224.

Длина самца 4,8—5,4 мм, самки 4,9—5,5; ширина самца 1,5—1,7, самки 1,5—1,9 мм.

Прим., Хасанский р-н: Рязановка, 10 км северо-восточнее Сухановки, 8.VII 1981 (Кс.), 1 самец, 1 самка; там же, 7, 31.VII 1982 (К.), 17 самцов (в том числе голотип, 7.VII), 25 самок; Витязь, 15 км южнее Сухановки, 13.VII, 4.VIII 1982 (К.), 14 самцов, 5 самок.

Живет на дубе зубчатом. (*Quercus dentata*).

К новому виду близок дальневосточный *Ph. coryloides* Jos. et Kerzh., живущий на *Corylus*, но он в среднем меньше (4,0—4,8 мм), переднеспинка у него не шире 1,2 мм, 1-й членик усиков чаще бурый или желтовато-бурый, хорошо отличается он и строением гениталий самца, особенно мембранозным выростом близ середины эдеагуса.

Psallus (Apocremnus) stackelbergi Kerzhner, sp. n.; рис. 225—230

Тело у самца в 2,5—2,6, у самки в 2,3 раза длиннее своей ширины, сверху довольно блестящее, голова в беловатых волосках,