

*Psallus (Phylidea) loginovae* Kerzhner, sp. n.; рис. 231—238

Тело у самца в 2,2, у самки в 2-2,1 раза длиннее ширины, блестящее. Голова в слабоуплощенных и слегка изогнутых серебристых волосках. На переднеспинке волоски серебристые, чешуйковидные, по бокам к ним добавляются длинные простые черные волоски. На надкрыльях и щитке имеются серебристые или слегка золотистые чешуйковидно уплощенные и прилегающие тонкие черные волоски. Низ в простых светлых волосках.

Голова у самца грязно-бурая, у самки часто красная, темя желтоватое. Усики желтые, 1-й членик в основании узкочерный, без бурых пятен при основании щетинок, 4-й, а иногда и 3-й членики буроватые. Хоботок желтый, 1-й, основание 2-го и вершина 4-го члеников темно-бурые. Переднеспинка темно-красная или отчасти желтовато-красная, передняя доля ее и иногда задний край у самца темно-бурые, у самки иногда затемнены срединная часть мозолистых возвышений и задние углы. Щиток и надкрылья темно-красные, основание кунеуса без светлой полосы или с очень узкой, у обоих полов внутренний угол кориума иногда с темно-бурым пятном. Перепоночка темно-серая, жилки светлые, вокруг малой ячейки красноватые, основание перепоночки и неправильной формы полоса или большие пятна позади ячеек (особенно у вершины кунеуса) более светлые. Низ груди от оранжевого до грязно-красного, передние тазиковые покрывки и иногда ксифус белые или желтые, середина среднегруди черная, площадки пахучих желез на заднегруди желтовато-белые, у самца иногда черные со светлым задним краем. Брюшко снизу красное, реже буро-черное, с красной вершиной. Тазики красновато-желтые, красные или отчасти буроватые. Бедра темно-красные, задние на верхней стороне у вершины и на большей части нижней стороны с нерезко выделяющимися бурыми пятнами, на передних и средних темные пятна менее выражены, чем на задних, и иногда отсутствуют. Голенн желтые, в основании слегка красноватые, с толстыми черными щетинками, выходящими из очень крупных черных пятнышек. Лапки желтые, 3-й членик на передних и средних ногах весь, на задних в вершинной половине черный.

Ширина головы у самца 0,76 мм, самки 0,79, ширина темени у самца 0,37—0,39, у самки 0,4, длина члеников усиков начиная с 1-го 0,20—0,21; 0,96—1,03; 0,54—0,60; 0,30—0,36 мм. Хоботок доходит до середины задних тазиков. Длина переднеспинки 0,71—0,76 мм, ширина 1,36—1,43 мм.

Генитальный сегмент самца большой (слегка длиннее половины длины брюшка), снизу без киля, по бокам с черными волосками. Парамеры и тека — рис. 231—234. Эдеагус С-образный, массивный, с длинным склеротизованным отростком почти от середины бокового края, закрывающим вторичный гонопор, на вершине с тонким незазубренным выростом, близ