

вершины с мембранозной лопастью, несущей по краю 3 ряда зубчиков.

Длина 3,5—3,6 мм; ширина самца 1,6, самки 1,7—1,8 мм.

(Прим.): 18—20 км южнее Хороля, 7.VII 1974 (Логинова), 3 самца (в том числе голотип), 3 самки; окр. Андреевки, 10 км южнее Сухановки, 10.VII 1982 (К.), 1 самец. Отнесены к этому же виду, но не включены в типовую серию следующие экземпляры из Приморского края: Уссурийск, 7.VII 1959 (Фалькович), 4 самки (ранее ошибочно включены в паратипы *P. ulmi* Kerzh. et Jos.); ст. Спутник близ Владивостока, 28.VI 1978 (Кн.), 1 самка; р. Комаровка, 20 км юго-восточнее Уссурийска, 29.VI 1981 (Кс.), 1 самка.

Живет на клене приречном (*Acer ginnala*).

Из дальневосточных видов внешне наиболее похож на *P. ulmi* Kerzh. et Jos. и *P. cinnabarinus* Kerzh. (оба с *Ulmus*), отличается крупными черными пятнами на голенях. По форме эдеагуса похож на европейско-средиземноморского *P. variabilis* Fall., но у последнего генитальный сегмент самца с килем, вершинный отросток эдеагуса короче и более изогнутый, окраска обычно темнее (переднеспинка, щиток, бедра часто целиком черные), темные пятна на голенях обычно небольшие.

*Psallus* (?*Phylidea*) *flavescens* Kerzhner, sp. n.; рис. 239—244

Тело у самца в 2,4—2,6, у самки в 2,3—2,5 раза длиннее своей ширины, сверху довольно блестящее, голова в беловатых волосках, переднеспинка, щиток и надкрылья с прилегающими серебристыми узкими чешуйковидными и бурыми (на кунеусе и в задней части корнума, а иногда и на всей кожистой части надкрылья черными) простыми волосками приблизительно равной длины.

Голова и переднеспинка всегда желтые, щиток и передняя половина надкрылья от желтых (у части самок) до оранжево-красных, а в задней части корнума и большей части кунеуса окраска становится соответственно ярко-оранжевой до светло-красной. Основание кунеуса беловатое. Перепоночка темно-серая, жилки на ней желтоватые или оранжевые, а жилка, замыкающая сзади малую ячейку, беловатая, к этой жилке и вершине кунеуса примыкает слегка более светлый участок перепоночки. Усики светло-желтые, без темных пятен. Хоботок светло-желтый, 4-й членик на вершине буроватый. Ноги светло-желтые бедра с бурыми пятнами, которые на задних бедрах довольно густые и беспорядочно расположены вблизи вершины сверху и снизу и образуют 2 продольных ряда в остальной части нижней стороны. Голеня с длинными черными щетинками, выходящими из небольших темно-бурых пятен. 3-й членик лапок в вершинной половине буроватый. Низ тела у самки весь светло-желтый, у самца брюшко бурое, генитальный сегмент весь или в большей части оранжево-желтый.