

самца граница клавуса и кориума узкобеловатые. Кунеус беловатый, с немногочисленными светло-красными расплывчатыми пятнами или в большей части светло-красный, но с беловатым основанием. Перепоночка серая, с беловатыми жилками. Грудь и брюшко снизу беловато-желтые, на боках переднегруди 2 продольные светло-красные полосы с каждой стороны, на остальных сегментах груди и брюшке отдельные светло-красные или оранжевые пятнышки. Ноги беловатые или беловато-желтые, бедра сверху и особенно снизу с многочисленными несливающимися бурыми пятнышками, голени с черными щетинками и небольшими бурими точками при их основании, длина щетинок в 1,7 раза больше толщины голени, 3-й членик лапок с буровой вершиной.

Ширина головы 0,86—0,87 мм, ширина темени у самца 0,37, у самки 0,42—0,43 мм. Длина члеников усиков 0,25; 1,31—1,51; 0,64—0,71; 0,31—0,36 мм. Хоботок доходит до средних тазиков. Длина переднеспинки 0,73—0,77 мм, ширина 1,53—1,57 мм. Длина задней голени 2,5 мм.

Генитальный сегмент без выростов, снизу с неясным килем, сверху близ основания с каждой стороны с группой густых и темных волосков. Парамеры и тека — рис. 245—247. Эдеагус С-образный, массивный, на вершине с 2 отростками, из которых один лопастевидный и покрыт многочисленными зубцами, а другой без зубцов.

Длина самца 4,5 мм, самки 4,7—4,8; ширина самца 1,8, самки 1,9—2 мм.

Прим. Витязь, 15 км южнее Сухановки, Хасанский р-н, 13.VII 1982 (К.), 1 самец (голотип), 2 самки.

Живет на дубе зубчатом (*Quercus dentata*).

Новый вид близок к *P. tesonganicus* Jos. и *P. amoenus* Jos., эти виды отличаются по строению эдеагуса и по окраске: у *P. tesonganicus* переднеспинка, щиток и надкрылья в равномерно распределенных небольших красных пятнах, бурых пятнышек при основании волосков нет или имеются (у самца) только на переднеспинке; у *P. amoenus* щиток в красноватых пятнышках, без бурых, белой продольной полосы на переднеспинке и щитке нет, низ задних бедер хотя бы отчасти красноватый, темные пятна на нем гуще и отчасти сливаются. Эдеагус у *P. amoenus* значительно тоньше и длиннее, у *P. tesonganicus* с иной формой вершинных отростков.

Orthonotus bicoloripes Kerzhner, sp. n.
рис. 249—253.

Тело у самца с почти параллельными боковыми краями, у самки расширено к задней трети, в среднем у самца в 2,5, у самки в 2,2 раза длиннее ширины. Верх блестящий. Голова, переднеспинка и щиток в беловатых или серебристых слегка уплощенных изогнутых, чаще всего прижатых волосках. На