

груди. Похожа на самок западноевропейских *L. rufoscutellata* Var и *L. bedeli* Mont., но у них верх тела блестящий, передне-спинка короче и задние углы ее не оттянуты или слабо оттянуты.

Myrmedobia exilis (Fallén, 1807). Амур.: 10 км севернее Магдагачи (К.). [см. Péricart, 1972 — «Амур»]. Прим.: гора Облачная.

M. distinguenda Reuter, 1884. Прим.: заповедник «Кедровая Падь», в широколиственном лесу на поваленном стволе (К.), 1 самка. В СССР был указан из Крыма и Брянска [Péricart, 1972], новые находки: Эстония (Эльва), Калининградская (Рыбачий) и Московская (Поречье) области, Красноярский край (Мирное на Енисее).

Сем. Miridae

* *Myiomma* sp. Прим.: Рязановка, на *Quercus dentata*, 30. VII 1982 (К.), 1 личинка. Род впервые отмечается для СССР.

✓ *Michailocoris josifovi* Stys, 1986 = *M. kerzhneri* Stys, 1986, s у п. п. *M. josifovi* описан по самкам, *M. kerzhneri* — по самцам. Я не располагаю дополнительным материалом, но склонен считать различия этих форм половыми, а не видовыми.

Cyrtopeltis tenuis Reuter, 1895. Амур.: Тамбовский р-н, 30 км восточнее Благовещенска, Амурская опытная станция, 7. IX 1931 (В. Верещагин), 1 самка. Скорее всего, завезенный с посадочным материалом экземпляр. Вид широко распространен в тропиках и субтропиках, в том числе в Китае и Японии, в СССР недавно обнаружен в Армении, обычен на возделываемых пасленовых (табак, помидоры), на которых, вероятно, питается тепличной белокрылкой (*Trialeurodes vaporariorum* Westw.).

Neodicyphus annulifer (Lindberg, 1927), с о т в. п. = *Dicyphus annulifer* Lindberg, 1927. Маг.: хр. Большой Анначаг (Б.). Короткие сильно изогнутые и лишенные базального выступа коготки, доходящие до вершины коготка пульвиллы, наличие всего 3 трихоботрий на средних и задних бедрах, габитус и окраска указывают на принадлежность этого восточноазиатского вида к роду *Neodicyphus* McGavin, известному ранее только из Америки.

Bothynotus pilosus (Boheman, 1852). Маг.: хр. Большой Анначаг (Б.). Хаб.: р. Алдома (Снигиревский).

* *Stethoconus japonicus* Schumacher, 1917. Прим.: Андреевка (С.).

* *Alloetotomus chinensis* Reuter, 1904. Прим.: Витязь (К.), Андреевка (С.). На *Pinus densiflora*. Прежние указания для СССР относятся к *A. simplicis* (Uhl.) [Josifov, Kerzhner, 1972; Кержнер, 1978].

Deraeocoris olivaceus (Fabricius, 1777) = *D. brachialis* Stål, 1858, s у п. п. *D. olivaceus* описан из Западной Европы, *D. brachialis* — из Иркутска. Изучение больших серий показало, что