

особи из Восточной Сибири и Дальнего Востока заметно крупнее западноевропейских, но ареал вида практически непрерывный и изменчивость носит клинальный характер.

D. annulipes (Herrich-Schaeffer, 1842) = *D. nebulosus* (Jakovlev, 1889), пом. праеосс., с у п. п. = *D. dybowskii* Kiritshenko, 1926, пом. п. про *nebulosus*, с у п. п. Голотип *D. nebulosus* (из Култука на Байкале) не сохранился, но описание хорошо соответствует очень темным особям *D. annulipes*.

* *D. koreanus* Linnavuori, 1963. Прим.: заповедник «Кедровая Падь» (К.).

Camptozygum aequale (Villers, 1798). Амур.: Симоново, на *Pinus sylvestris* (К.).

Zygitus nigriceps (Fallén, 1829). Хао.: ст. Высокогорный, на *Juniperus*, 15—17. VII 1979 (Кн.).

* *Lygocoris* (*Neolygus* ?) *rubronasutus* (Linnavuori, 1961). Прим.: Рязановка, Витязь (К.). На *Quercus dentata*.

L. (Apolygus) hilaris (Horváth, 1905), рис. 85, 86. В связи с тем что в предыдущих работах, в том числе моих, этот вид смешивался с другими, привожу список изученных экземпляров. Амур.: Симоново (К.), Корсаково (К.), п-ов Самодон (К.). Хаб.: ст. Лондоко (Кс.). Прим.: Виноградовка (Кириченко), Седанка близ Владивостока (Ростовых), Находка (К.), Новокачалинск (К.), заповедник «Кедровая Падь» (К.), ур. Голубиный Утес близ Хасана (К.). П-ов Корея: пер. Худжирёнг (Борхсениус). Япония: Kobe, Assakawa, Такао-san (Женжурист). Мною изучен и обозначен лектотип: самка с этикетками «Japonia, Tokio, Matsumura», «*Cyphodema hilare* Horv.», Hungarian National Museum of Natural History. Вид живет на *Lespedeza bicolor*. Ранее опубликованные рисунки гениталий *L. hilaris* [Josifov, Kerzhner, 1972; Кержнер, 1977] относятся к *L. syringae* Kerzh.

L. (A.) furvus Kerzhner, 1972, sp. dist. Дополнительный анализ показал, что *L. furvus* не идентичен *L. hilaris*, как я считал ранее [Кержнер, 1977], а является самостоятельным видом. Он достоверно найден только на Сахалине, Кунашире и Шикотане, живет на *Hydrangea paniculata*. Часть паратипов уже ранее была отнесена к *L. infamis* Kerzh. [Кержнер, 1977], принадлежность паратипов из Амурской обл. и из Виноградовки ввиду отсутствия среди них самцов остается спорной.

Lygus rugulipennis Poppius, 1911 = *L. disponi* Linnavuori, 1961, с у п. п. Под названием *L. disponi* описана характерная для южных районов Дальнего Востока форма *L. rugulipennis* с сильно развитым темным рисунком на переднеспинке у самцов. Аналогичная форма встречается и в других южных частях ареала *L. rugulipennis*, в частности на Кавказе. Указание для п-ова Корея [Josifov, Kerzhner, 1972] *L. wagneri* Rem. основано на ошибочном определении *L. rugulipennis*.

Orthops Fieber, 1858. В традиционном понимании этот род