



Рис. 255—263. 255 — *Loricula pilosella* Miy., самка; 256 — *Hallodapus sibiricus* Poppr., п-ов Самодон, Амурская обл., вершина эдеагуса при сильном увеличении; 257 — *H. rufescens* Wigm., окр. Луги, Ленинградская обл., то же; 258 — *H. pumilus* Hovg., Заповедный, Приморский край, то же; 259 — *H. montandoni* Reut., Крым, то же; 260 — *Plagiognathus chrysanthemi* Wolf, Ленинградская обл., вершина эдеагуса; 261 — *P. collaris* Mats., Приморский край, то же; 262 — *Dimorphopterus japonicus* Hidaka, щиток и надкрылья короткокрылого самца; 263 — *D. spinolae* Sign., то же

Партизанского р-на (Ростовых), р. Барабаш близ заповедника «Кедровая Падь» (К.). Мною собран на *Chosenia arbutifolia*.

*Phylus stundjuki* Kulik, 1973. Прим.: Виноградовка (Кириченко), Уссурийск, в колонии грушевой тли (Воронин), Горнотаежное (С.).

*Psallus tonnaichanus* Muramoto, 1973 = *P. dryos* Kerzhner, 1979, s u n. n. Мурамото [Muramoto, 1973, p. 2897] под названием «*Psallus tonnaichanus*» (без указания автора или новизны таксона) опубликовал фотографию и краткое описание кариотипа. Формально эти данные обеспечивают пригодность названия. В письме ко мне Н. Мурамото указал, что название сообщил ему С. Миямото (S. Miyamoto), вероятно намеревавший его для нового вида, ошибочно определенного Р. Линнавуори [Linnavuori, 1961], а затем и почти всеми японскими авторами, включая Миямото и Мурамото (в последующих работах), как *P. wagneri* Oss. Н. Мурамото любезно прислал мне 2 самца, собранных им в Хакодате (Hakodate) 30. VII 1971 и являющихся синтипам *P. tonnaichanus*. Один из них обозна-