

чается здесь как лектотип. Указанные лектотип и паралектотип хранятся в Зоологическом институте АН СССР.

P. tonnaichanus dolerus Kerzhner, 1979, с о т в. н. = *P. dryos dolerus* Kerzhner, 1979. Особи из южной части Хасанского р-на Приморского края в среднем крупнее и темнее типичных и образуют переход к номинативному подвиду, они были собраны на *Quercus dentata*.

P. cinnabarinus Kerzhner, 1979. Прим.: Горнотаежное (С.), Витязь (К.).

* *P. amoenus* Josifov, 1983. Прим.: Витязь, на *Quercus dentata* (К.).

* *P. atratus* Josifov, 1983. Прим.: Уссурийск (Воронин, Шаблюковский), Моносино (Кн.). Ворониным собран на *Rugus ussuriensis* в колонии тлей.

P. crataegi Kulik, 1973. Амур.: 30 км восточнее Благовещенска (Верещагин). Прим.: Шмаковка (Энгельгарт), Монголия: р. Онон у Биндэра, на *Crataegus* (К.).

P. ermolenkoi sichotensis Kerzhner, 1979. Маг.: хр. Большой Анначаг, на *Pinus pumila* (Б.).

[*P. variabilis* (Fallén, 1807). Указания для Приморского края и Амурской обл. [Кулик, 1965; и др.] относятся к *P. ulmi* Kerzh. et Jos., а для Камчатки [Кириченко, 1926] — к *P. cognatus* Jak.].

[*P. diminutus* (Kirschbaum, 1856). Указание для Прим. [Lindberg, 1934] явно ошибочно.].

[*P. lapponicus* Reuter, 1974. Указание из Охотска [Reuter, 1910], вероятно, относится к *P. laricinus* Vinokurov].

Atractotomus morio J. Sahlberg, 1883. Прим.: Горнотаежное (С.).

Dacota Uhler, 1872, gen. dist. = *Nyctidea* Reuter, 1903, s у п. н. Синонимия *Dacota* с *Atractotomus* Fieb. была установлена Найтом [Knight, 1931] ошибочно. В действительности *Dacota* — старший синоним *Nyctidea*, их типовые виды — также синонимы.

D. hesperia Uhler, 1872 = *Nyctidea nigra* (Jakovlev, 1889), s у п. н. Синонимия установлена на основании сравнения большого материала, в том числе типов, *N. nigra* с несколькими экземплярами из США, определенными Шу (Dr. R. T. Schuh) как *D. hesperia*. Они хорошо соответствуют описанию Найта [Knight, 1931], сравнивавшего свой материал с типом *D. hesperia*.

[*D. (Leguminola) nigratarsis* (Jakovlev, 1881), с о т в. н. = *Nyctidea (Leguminola) nigratarsis* (Jakovlev, 1881). Указание для Прим. [Кулик, 1974] основано на ошибочном определении *Excentricus planicornis* H. = S.].

[*D. (L.) albipennis* (Reuter, 1876), с о т в. н. = *Nyctidea (Leguminola) albipennis* (Reuter, 1876)].

Orthonotus Stephens, 1829 = *Ectenellus* Reuter, 1906. s у п.