

n. = *Homolaner* Kiritshenko, 1951, s y n. n. = *Ferganocoris* Josifov, 1968, s y n. n. Большинство видов рода распространено на юге Европы, на Кавказе, в Передней и Средней Азии, но 2 вида найдены на Дальнем Востоке. Виды с Дальнего Востока (*O. tibialis* Reut., *O. bicoloripes* Kerzh.) и 1 вид из Средней Азии (*O. fuscicornis* Reut.) полнокрылые, большинство видов диморфные (самцы полнокрылые, самки обычно короткокрылые), у высокогорного эндемика Кавказа *O. luteocinctus* Kir. оба пола короткокрылые (у отнесенного к роду с сомнением *O. bicolor* Reut. из Греции известен только короткокрылый самец). У короткокрылых самок *O. kerzhneri* Jos. (Ферганский хребет) кориум и клавус разделены швом и укороченная перепоночка довольно большая, с 2 ячейками, у короткокрылых самок других видов кориум и клавус слились, перепоночка рудиментарная или отсутствует. Окраска усиков варьирует от целиком или отчасти черной до целиком светлой (*O. kerzhneri*, *O. luteocinctus*). В тех же пределах варьирует окраска бедер. Верх тела может быть черным или в значительной части светлым. Однако учитывая большое сходство видов в строении претарзуса и гениталий самцов, в габитусе и опушении, вряд ли целесообразно использовать последовательные этапы редукции крыльев и изменений в окраске, а также незначительные отличия в пропорциях головы [Reuter, 1906; Josifov, 1968] для выделения небольших отдельных родов.

[*O. tibialis* (Reuter, 1906), с o m b. n. = *Ectenellus tibialis* Reuter, 1906. Изучен голотип, неокрепший самец, хранящийся в ЗИН].

[*O. luteocinctus* (Kiritshenko, 1951), с o m b. n. = *Homolaner luteocincta* Kiritshenko, 1951. Изучена типовая серия].

[*O. kerzhneri* (Josifov, 1968), с o m b. n. = *Ferganocoris kerzhneri* Josifov, 1968. Изучена типовая серия].

Compsidolon kerzhneri Kulik, 1973. Амур.: п-ов Самодон на Амуре близ Корсаково (Г. Зиновьев). Прим.: Новокачалинск (К., А. Зиновьев). Живет не на «кустарниковой лапчатке», как указано в первоначальном описании, а на кустарниковой полыни (*Artemisia gmelinii*).

* *Phoenicocoris kyushuensis* (Linnavuori, 1961), с o m b. n. = *Psallus kyushuensis* Linnavuori, 1961. Прим.: Уссурийский заповедник (Кулик), 20 км южнее горы Облачная (К.), Барабаш-Левада (К.), Витязь (К.). На *Pinus koraiensis*, *P. densiflora*. По строению эдеагуса (S-образный, немассивный, с простым вершинным отростком, вторичный гонопор заметно удален от вершины и расположен на мембранозном участке) этот вид не может быть отнесен к роду *Psallus* Fieb. По мнению М. Иосифова, с которым я согласен, его следует перенести в род *Phoenicocoris* Reut., хотя он и отличается от других видов этого рода более светлой окраской, особенно надкрылий и щитка (вполне окрепшие особи других видов черные), коротко опушенными глаза-