

ми, очень крупными у самца, темными пятнами и бурыми шипиками на голених (у других видов пятен нет, а шипики черные), одним вершинным отростком эдеагуса (у других видов их два и они более длинные). Другой палеарктический род *Plesiodema* Reut. трибы Phylini, живущий на соснах, отличается от рассматриваемого вида простым (без серебристых чешуек) опушением верхней стороны тела, слабо расширенными задними бедрами и С-образным эдеагусом.

*Ph. obscurellus* (Fallen, 1829). Амур.: Симоново (К.).

*Ph. modestus* (Meyer-Dür, 1843). Амур.: Симоново (К.).

*Sejanus potanini* (Reuter, 1906), с о m b. n. = *Sthenarus potanini* Reuter, 1906. Изучен голотип *S. potanini*, самка из Сычуани, и серия экземпляров из Приморского края (Виноградовка, Киевка, Уссурийск, Владивосток, заповедник «Кедровая Падь», Андреевка, Витязь). В Приморском крае вид живет на *Alnus* и *Salix*. К роду *Sejanus* Dist., характерному для Ориентальной и Австралийской областей, вероятно, относятся и остальные 3 вида из Сычуани, описанные в роде *Sthenarus*.

*Parapsallus vitellinus* (Scholtz, 1847). Амур.: Климоуцы, на *Larix* (К.). Прим.: Усть-Проходной в Сихотэ-Алинском заповеднике (Ануфриев), Горнотаежное, в дендрарии на свет (С.).

*Plagiognathus collaris* (Matsumura, 1911) = *P. arbustorum* var. *pallidipennis* Reuter, 1906 [nom. praecoc., non *P. pallidipennis* J. Sahlberg, 1868 = *Plesiodema pinetellum* (Zetterstedt, 1838)], с у n. п. Лектотип (обозначен здесь) *P. arbustorum* var. *pallidipennis* Reut., самец с этикетками «Сычуань, дол. Кусёр, Мунгу—Чуити, 12.VIII 93 (Потанин)», «*Plagiognathus arbustorum* F. var. *pallidipennis* Reut. typ.», и паралектотип, самка из того же сбора, хранятся в ЗИН. *P. collaris* отличается от *P. arbustorum* F. по строению вершины эдеагуса (рис. 261, 262). Именно к *P. collaris* относятся все предшествующие указания *P. arbustorum* с Дальнего Востока СССР. Ареал *P. collaris* нуждается в уточнении, он найден кроме Дальнего Востока (до Магаданской обл.) в Якутии [Винокуров, 1979, рис. 509—513], Забайкалье, на Алтае, в Японии и Восточном Китае; в частично изученных материалах из европейской части СССР не обнаружен.

\* *P. yomogi* Miyamoto, 1969. Прим.: Уссурийский заповедник (Шаблювский, Кашеев, Кс.), Виноградовка (Кириченко), Яковлевка (Дьяконов, Филипьев), Владивосток (К.), Андреевка (С.), Витязь (К.). На *Artemisia rubripes*.

*P. pini* Vinokurov, 1978. Маг.: хр. Большой Анначаг, на *Pinus pumila* (Б.).

[*P. bipunctatus* Reuter, 1883. Указание для Хаб. [Кулик, 1965; и др.] относится к *P. chrysanthemi* Wolff.].

*Chlamydatus drymophilus* Vinokurov, 1982. Прим.: гора Облачная (К.).

*Ch. opacus* (Zetterstedt, 1838). Чукотка: р. Амгуэма, 30 км