

- 17 (18). Кунеус одноцветный, серовато-желтый, без красных пятен. Окраска тела зеленовато-желтая. Переднеспинка и надкрылья покрыты золотистыми чешуйками. Боковой край вершины эдеагуса с зубчиками (рис. 28) . . . . . 9. *Psallus* (s. str.) *georgicus* I. Zaitzeva, sp. n.
- 18 (17). Кунеус хотя бы отчасти красный, желтовато-красный или бурый.
- 19 (22). Генитальный сегмент ♂ без продольного киля. Окраска тела бледная, желтоватая. Надкрылья в задней половине красноватые или оранжевые.
- 20 (21). Вершина эдеагуса на конце с когтевидным отростком (рис. 29—31) . . . . . 10. *Psallus* (s. str.) *cruentatus* Muls.
- 21 (20). Вершина эдеагуса на конце закруглена, без когтевидного отростка (рис. 32, 33) . . . . . 11. *Psallus* (s. str.) *diminutus* Kbm.
- 22 (19). Генитальный сегмент ♂ снизу с продольным килем.
- 23 (24). Вершинный отросток эдеагуса покрыт зубцами только в основании (рис. 34, 35). Желтовато-красный или светло-бурый, переднеспинка и надкрылья покрыты густыми, светлыми и черными волосками . . . . . 12. *Psallus* (s. str.) *varians* H.-S.
- 24 (23). Вершинный отросток эдеагуса покрыт зубцами по всей длине.
- 25 (26). Вершинный отросток эдеагуса покрыт зубцами с двух сторон (рис. 36, 37). Тело красное или буровато-красное . . . . . 13. *Psallus* (s. str.) *lepidus* Fieb.
- 26 (25). Вершинный отросток эдеагуса покрыт зубцами только с одной стороны (рис. 38—41).
- 27 (28). Темя в 3 раза уже ширины головы. Ряд зубчиков на конце вершины эдеагуса не раздваивается. Предвершинный отросток эдеагуса длинный (рис. 38, 39) . . . . . 14. *Psallus* (s. str.) *falleni* Reut.
- 28 (27). Темя в 2 раза уже ширины головы. Ряд зубчиков на конце вершины эдеагуса раздваивается. Предвершинный отросток эдеагуса короткий, не выступает за наружный край вершины эдеагуса (рис. 40, 41) . . . . . 15. *Psallus* (s. str.) *minusculus* I. Zaitzeva, sp. n.

#### 1. *Psallus* (*Apocremnus*) *ambiguus* Fall. (рис. 1, 2).

♂. Тело черное или темно-коричневое, покрыто блестящими серебристыми чешуйками и черными волосками. Голова черная, затылок всегда светлее, часто почти желтый. 1-й и 2-й членики усиков черные, остальные членики усиков желтые. Темя в 2.5 раза уже ширины головы. Переднеспинка темная — черная или темно-коричневая. Надкрылья темные. Кунеус красновато-коричневый. Брюшко черное. Ноги светлые, бедра коричневатого-желтые, без пятен, голени несколько светлее, чем бедра, с черными щетинками. Вершина эдеагуса без зубчиков, оканчивается острым когтевидным отростком.

♀. Походит на самца, отличается только отчасти желтым 2-м члеником усиков и более ярко-красным кунеусом.

Длина тела 3.6—5.0 мм.

М а т е р и а л: Сев. Кавказ — 4 ♂♂, Оштен-Фишт, 30 VI 1957 (Курнаков); Грузия — 2 ♂♂, оз. Рипа, 29 VII 1958 (Жильцова); 1 ♂ и 6 ♀♀, Ахали-Сокели, Триалетский хребет, 21 VI 1961 (И. Зайцева); 2 ♀♀, Банихское ущ., 3 VI 1961 (М. Шидловский); 1 ♂, Бакуриани, 5 VII 1949 (Кириченко).

О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е: лесная зона европейской части СССР, вся Европа. Зоофитофаг, живет на лиственных породах. Нами собран с дуба. Имаго VI—VII. Зимуют яйца.

#### 2. *Psallus* (*Apocremnus*) *betuleti* Fall. (рис. 3, 4).

♂. Тело черное или красновато-коричневое, покрыто серебристыми чешуйками и черными волосками. Голова черная, затылок всегда светлый. Усики черные. Темя в 2.2 раза уже ширины головы. Переднеспинка черная, темно-коричневая или красновато-коричневая. Надкрылья черные или коричневые, вершина щитка и вершинная половина надкрыльев часто красноватые. Кунеус коричневатого-красный, в основании со светлым пятном. Ноги коричневые, бедра красновато-коричневые, голени желтовато-коричневые с темными щетинками. Вершина эдеагуса в виде длинного узкого отростка, у основания которого расположена небольшая округлая