

4. *Psallus (Phylidea) quercus* Kbm. (рис. 10—14).

♂. Тело черное или красновато-коричневое, покрыто беловатыми чешуйками и черными волосками. Голова темная. Усики светлые. 2-й членик усиков в 1.2 раза длиннее, чем длина 3-го и 4-го членика усиков вместе взятых.

Переднеспинка красновато-коричневая. Надкрылья темные, в основании часто светлые или даже желтовато-коричневые. Кунеус темный, красно-коричневый, в основании с узкой светлой полосой. Бедра темные, вершина бедер всегда светлая, голени светло-желтые, иногда слегка красноватые. Вершинный отросток эдеагуса короткий и тонкий, почти в 5 раз короче самого эдеагуса. У основания вершинного отростка имеется почти прямое, лежащее почти в одной плоскости широкое кольцо, усаженное зубцами.

♀. Походит на самца, отличается лишь несколько более светлой окраской.

Длина тела 3.5—4.3 мм.

М а т е р и а л: Северный Кавказ — 2 ♂♂, Петровск [Махачкала], Дагестан, 26 V 1926 (Рябов); 1 ♂, пер. Буйнакск-Аркас, Дагестан, 18 VI 1941 (Рябов); 1 ♂, с-ца Абинская, 16 VI 1939 (Рысаков).




Рис. 15—17. *Psallus variabilis* Fall.
15, 16 — вершина эдеагуса; 17 — эдеагус.

Общее распространение: Крым, Кавказ, Европа.
Живет на дубе, имаго V—VII. Зимуют яйца.

5. *Psallus (Phylidea) variabilis* Fall. (рис. 15—17).

♂. Тело черное или желтовато-коричневое, покрыто блестящими золотистыми чешуйками и черными волосками. Голова черная, затылок желтоватый, усики желтые, 1-й членик усиков в основании узко зачернен, 2-й членик усиков немного длиннее, чем 3-й и 4-й вместе взятые. Переднеспинка темная, задние углы ее часто более светлые. Надкрылья темные. Кунеус коричневый с узким изогнутым светлым пятном в основании. Бедра черные или темно-коричневые, голени светло-желтые с темными точками и черными щетинками. Генитальный сегмент самца с явственным продольным килем. Вершина эдеагуса слегка загнутая, заостренная, с небольшой группой зубчиков, расположенных на боковом утолщении.

♀. Походит на самца, лишь несколько светлее по окраске.

Длина тела 3.8—4.1 мм.

М а т е р и а л: Северный Кавказ — 1 ♂, Красный лес, нижн. теч. р. Кубань, 19 V 1937 (Рысаков); Грузия — Бакуриани, 19 VI 1918 (Кириченко); Армения — 1 ♀, Цахкадзор, 15—25 VI (Малюженко); Азербайджан — Аджикент, 29 VII, Геоктапа, 28 IV, Лирик, IV—V (Кириченко, 1918).

Общее распространение: Лесная зона европейской части СССР, Крым, Кавказ, Европа, Алжир. Указания для Сибири и Камчатки, по сообщению И. М. Кержнера, относятся к другим видам.

Зоофаг, живет на лиственных породах, преимущественно на дубе. Имаго V—VIII. Зимуют яйца.