

нышками. Усики светло-желтые. Основание 1-го членика усиков узко затемнено. 2-й членик усиков короче 3-го и 4-го вместе взятых. Переднеспинка желтая, с неясными красноватыми пятнами. Надкрылья желтые, верхняя половина их явственно красноватая. Кунеус красный, основание его, реже он весь белый. Ноги желтые, бедра красновато- или коричневато-желтые, с четкими темными пятнами. Вершина эдеагуса с крупным изогнутым когтевидным отростком, основание которого покрыто группой зубчиков.

♀. Походит на самца, обычно несколько светлее.

Длина тела 3.8—4.6 мм.

М а т е р и а л. Северный Кавказ — 3 ♀♀, Красная Поляна, 7 V (Кириченко), 16 VI, 7 VII 1935 (Чистовский); 1 ♀, пер. Опшен-Фишт, 30 VI 1957 (Курнаков); 3 ♂♂ и 1 ♀, станица Славянская, нижн. теч. р. Кубань, 15 V 1937 (Рысаков); 1 ♀, Магеста вблизи Кавказского запов., 20 V 1935 (Любищев); 1 ♀, Петровск [Махачкала], Дагестан, 26 V 1926 (Рябов); Грузия — 2 ♀♀, Банисхевское уш., 3 VI 1961 (Шидловский); 6 ♀♀, Ахали-Сопели, 24 VI 1961 (Зайцева); 1 ♂ и 1 ♀, Бакуриани, 5 VII 1949 (Кириченко); Азербайджан — 1 ♀, оз. Гек-Гель, 14 VII 1927 (Русанова); 1 ♂, Лирик, 14 V 1909 (Кириченко).




Рис. 32—35. Вершина эдеагуса.

32, 33 — *Psallus diminutus* Kbm.; 34, 35 — *P. varians* H.-S.

О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е: средняя полоса и юг европейской части СССР, Кавказ. Европа.

Живет на лиственных деревьях, чаще на буке и дубе. Имаго V—VII. Зимуют яйца.

13. *Psallus* (s. str.) *lepidus* Fieb. (рис. 36, 37).

♂. Тело темное, красновато-коричневое, покрыто беловатыми чешуйками и черными волосками. Голова серовато-желтая, на темени имеются коричневые точки, усики желтые, основание 1-го членика усика узко зачернено; 2-й членик усиков немного длиннее 3-го и 4-го члеников, вместе взятых. Переднеспинка серовато-желтая. Основание надкрылий серовато-коричневое, верхняя их красноватая. Кунеус красный, в основании светлый. Ноги желтые, бедра равномерно покрыты темными пятнами. Вершина эдеагуса не заострена, зубцы располагаются с двух сторон вершины эдеагуса, предвершинный отросток узкий, длинный, на конце заострен.

♀. Походит на самца, немного более светлая.

Длина тела 3.8—4.4 мм.

М а т е р и а л: Армения — Цахкадзор (Кириченко, 1918); Азербайджан — 3 ♀♀, Лирик, Талыш, 14 V 1909 (Кириченко); 1 ♀, Хан-Булаг, Талыш, 28 V 1909 (Кириченко).

О б щ е е р а с п р о с т р а н е н и е: европейская часть СССР, Кавказ, Европа.

Обычно на ясене. Имаго V—VII. Зимуют яйца.