




图 1—5 宽束盲蝽, 新种 *Pilophorus latus* sp. nov.

1, 2. 左抱器不同方位 (left paramere viewed from 2 different directions) 3. 阳茎基鞘 (phallosome) 4. 右抱器 (right paramere) 5. 阳茎端膜 (vesica)

白色鳞毛簇, 抱器和阳茎端膜的形状也不相同。它与 *P. setulosus* Horvath 也相似, 但体色深, 抱器和阳茎端膜的形状明显不同。

黄平盲蝽, 新种 *Zanchius vitellinus* sp. nov. (图 6—8)

黄褐色, 体具同色斜立毛, 身体背面平坦。头顶平, 两眼间具两个大椭圆形深色斑, 每一斑中各具一淡色条纹, 两淡色条纹在头顶呈倒“八”字形; 额在眼前呈弧形圆鼓; 眼向侧方突出, 头的眼后部肿大似粗颈, 中叶 (tylus) 长方形明显突出。喙伸达后足基节。触角第 1 节外侧和第 2 节端部或末端粉红色。前胸背板梯形, 接近前缘处具一横长形下凹区, 使前缘呈棱脊状, 胫区微凸, 后缘直, 接近后角处向后弯, 使后侧角突出。中胸盾片长条形, 其后侧角明显下凹; 小盾片三角形, 平坦。前后翅皆透明, 具淡绿色色彩, 翅合拢时呈一平面, 两侧平行; 沿翅脉处毛的基部和膜片翅室内毛的基部呈绿色。身体腹面一色黄褐、足的跗节端部褐色, 副爪间突 (parempodium) 会聚状。雌虫生殖节纵裂超过腹中部, 雄虫第 9 腹节左侧具一伸向侧方的指状大刺 (图 8), 左抱器如图 7, 阳茎构造复杂, 如图 6 所示。体长雌虫 4.0, 雄虫 3.6, 头长 0.4, 宽 0.65, 眼间距 0.25, 触角各节长 I:II:III:IV = 0.3:1.5:0.95:0.80。前胸背板长 0.4, 前缘宽 0.45, 后缘宽 0.85, 头端至楔片缝长 2.75。

寄主植物: 大叶黄樫木 *Anthocephalus chinensis* (Lam.) Rich. ex Walp.