

MIRÍDEOS NEOTROPICAIS, CL: DESCRIÇÃO DE TRÊS ESPÉCIES NOVAS (Hemiptera).¹

JOSÉ C. M. CARVALHO * e J. MALDONADO CAPRILES

Museu Nacional, Rio de Janeiro, GB, e College of Agriculture, Mayaguez, Porto Rico

(Com 13 figuras no texto)

No presente trabalho os autores descrevem três espécies novas de mirídeos da fauna neotrópica. Os desenhos que ilustram o texto são de autoria de Ana Sueli Baldas e Luiz Antonio Alves Costa.

Parafulvius fasciatus n. sp.

(Fig. 1-4)

Caracterizada pelas suas dimensões, coloração e estrutura da genitália do macho.

Macho: comprimento, 2,9 mm, largura 0,8 mm. *Cabeça*: comprimento 0,5 mm, largura 0,5 mm, vértice 0,30 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 1,1 mm; III, 0,6 mm; IV, mutilado. *Pronoto*: comprimento 0,5 mm, largura na base 0,7 mm.

Coloração geral marron, tendendo a marrom-escura no pronoto, escutelo e cabeça, com áreas pálido-amareladas; faixa longitudinal mediana estreita na cabeça, inclusive no clipeo e pronoto, margens laterais do pronoto pálido-amareladas a bran-

co-leitosas; hemiélitro com o clavo, endocório e base interna do cúneo marrom-clavos a castanhos, exocório, embólio e margem externa do cúneo, pálidos; membrana fusca; antenas com base do segmento I, segmentos III e IV negros; formas pálido-amareladas, coxas posteriores tendendo ao castanho; lado inferior castanho a marrom-escuro.

Rostro atingindo o segmento genital, cabeça horizontal, clipeo saliente, pilosidade curta, subadpressa.

Genitália: pênis (fig. 2) alongado, como mostra a ilustração. Parâmero esquerdo (fig. 3) com duas ramificações junto ao terço basal e ápice rombudo. Parâmero direito (fig. 4) grosso e arredondado no ápice.

Fêmea: desconhecida.

Holótipo: macho, Colômbia, Villavencio, Meta, 18 sept. 1965, J. A. Ramos coll., na coleção do primeiro autor. *Alótipo*: fêmea, mesmos dados de coleta que para o holótipo. *Parátipos*: incluindo ambos os sexos, 8 exemplares, Peraloson, Caño Pachiaquiari, Meta, 4 de setembro 1965; 1 macho, Villavencio, Meta, 18 setembro 1965 e um macho Guayabetal, Cundinamarca, 18 setembro 1965; todos da Colômbia coletados pelo Dr. J. A. Ramos. Dois parátipos depo-

¹ Recebido para publicação a 3 de outubro de 1972.

Este trabalho recebeu colaboração parcial da Fundação Nacional de Ciências (NSF) dos Estados Unidos da América do Norte (GRANT — GB — 7382).

* Pesquisador conferencista do Conselho Nacional de Pesquisas.