

l'œil vu de dessus. Sillon occipital et sillons postoculaires nets. Rostre long, atteignant l'apex des hanches postérieures, clypeus court et bombé, séparé de la corne céphalique par un sillon profond. Antennes : premier article plus court que la tête et le pronotum ensemble, courbé au quart basal, avec deux plages un peu soulevées portant une soie; deuxième article deux fois plus long que le premier, plus mince; troisième article plus d'une fois et demie plus long que le premier; quatrième article (absent).

Collier pronotal plat, peu nettement délimité vers l'arrière; bord postérieur du pronotum échancré au milieu, arrondi vers les angles latéraux.

Écusson divisé en deux parties par un sillon transverse, la partie postérieure soulevée en bosse.

Pattes grêles et longues, hanches antérieures longues; les tibias antérieurs un peu enflés à l'apex, les médians droits, les postérieurs amincis, tous sont munis de quatre rangées de très courtes spinules formant une ponctuation brune le long de chaque arête.

La pilosité générale est réduite à de courts poils blancs assez épars, les antennes portent toutefois des poils courts, bruns et denses.

Type du genre : *Seversyia lupa*, n. sp.

***Seversyia lupa*, n. sp.** — Corps mat; teinte générale brun-chamois clair, plus ou moins ombré, à petites taches plus pâles sur le thorax et les hémélytres. Ligne centrale sur le pronotum plus claire, le clavus avec une tache blanchâtre à contours irréguliers au niveau de l'apex de l'écusson; sur la corie, une tache d'un noir velouté, rebordée en avant d'une lunule blanchâtre, estompée en arrière. Membrane légèrement et régulièrement enfumée. Ailes postérieures incolores.

Pattes et antennes brun-jaune, les fémurs un peu rougeâtres, les genoux pâles.

Longueur : 6 mm.

Holotype : 1 ♂. Bouaké 30-V-1949; ma coll.