

*ticus pronoti leviter sinuatis, ad angulos laterales macula parviscula nigra notatis; membrana hyalina; abdominis dorso pallido; connexivo albido-vel flavo-testaceo, nigro-maculato; tibiis apice tarsisque nigris vel nigro-fuscis.* ♂ ♀. Long.  $9\frac{1}{2}$ —10, lat.  $5\frac{1}{3}$ — $5\frac{2}{3}$  mm.

Dem *B. signatum* Jak. sehr ähnlich und nahe verwandt; die Körperform ist aber breiter, die grüne Farbe mehr verblasst, der Kopf breiter und nach vorne zu weniger verengt, der Hinterleibsrücken nicht schwarz, sondern bleichgrün und die Fühler sind mit Ausnahme des grünen Wurzelgliedes ganz schwarz. Die Oberseite des Körpers ist bisweilen etwas röthlichgelb angehaucht und die Unterseite blassgelblich.

***Cellobius abdominalis* Jak. var. *ferrugatus* nov. var.**

*Superne fusco-ferrugineus, subtus sordide rufescens, marginibus lateralibus anticis pronoti, margine costali corii basin versus connexivoque flavo-testaceis; antennis coccineis, articulo quinto apice flavescente, articulo primo nec non oculis, rostro, disco pectoris et abdominis basin versus pedibusque virescentibus, tarsis rufescentibus; abdominis dorso nigro, segmento ultimo dimidioque apicali segmenti penultimi rubris; membrana hyalina.* ♂. Long. 10 mm.

Von der bleicholivengrünen Stammform durch die röthlichbraune Färbung verschieden. Die Schenkel sind am Grunde ebenfalls etwas röthlich angelaufen.

***Rhaphigaster nebulosa* Poda, var. *brevispina* nov. var.**

*Spina basali ventris brevior, coxas intermedias haud superante.* ♂ ♀.

Diese Var., welche von H. Leder in mehreren Exemplaren gesammelt wurde, und welche ich von H. Oschanin auch aus Taschkent erhielt, unterscheidet sich von der Stammform durch den viel kürzeren Bauchspiess; er reicht nämlich nach vorne nur bis zwischen die Mittel Hüften.

Zwischenformen, bei denen der Bauchspiess die Mitte der Mittelbrust mehr oder weniger überragt, ohne jedoch die Vorder Hüften zu erreichen, kommen in Transkaukasien vor.

***Lopus infuscatus* Brull. var. *turcomanus* nov. var.**

*Picturis in forma typica miniatis, in hac varietate nova pallide aurantiaco-flavis; corio intus fusco-cinamomeo.* ♂ ♀.

Unterscheidet sich von der Stammform nur dadurch, dass die sonst roth gefärbten Theile hier mehr oder weniger bleich orange gelb sind.