

*Lygocoris (Neolygus) tiliicola* KULIK

W: Mjohjang Mts., 7. VIII. 1959, 1 ♂ und 1 ♀.

Außer den Exemplaren von KVDR und den Typen untersuchten wir auch weiteres Material aus dem Fernen Osten und möchten hier folgende Berichtigungen und Nachträge zur Originalbeschreibung machen:

Stirnschwiele apical beim ♂ immer, beim ♀ oft braun. Synthlipsis 0,64mal (♂) oder 0,92mal (♀) so breit wie der Augendurchmesser. Membran fast einfarbig dunkelbraun. Nur die Hinterfemora distal mit 2 bräunlichen, manchmal fehlenden Streifen auf der Oberseite und 2–3 kleinen braunen Punkten am Hinterrand. Genitalien wie an den Abb. 13–17. Länge: ♂ = 4,4–5,0 mm, ♀ = 5,0–5,7 mm.

*Lygocoris (Apolygus) spinolai* (M.-D.)

W: Mjohjang Mts., 4. VIII. 1959, 1 ♂; Pjôngjang, 2. IX. 1959, 3 ♂♂; Dephun bei Kujang-dong, 4. IX. 1959, 1 ♂; Wönsan, 1. IX. 1966, 1 ♂; Čhönne, 10. VI. 1965, 1 ♂; Hyngnam, 11. VI. 1965, 1 ♂; Hjangam-ri, Kreis Hjangsan, 19. VI. 1965, 1 ♂. L: Pusan, 25. VIII. (S); zwischen Mal'mi und Sombau, 18. IX. (S); Čöngdžu (B); Hjesan (B); Hudžirjông (B); Jangpjang (B); Kapsan (B); Pungsö (B); Sančhuri (B); Sinyidžu (B); Teso (B), 32 ♂♀.

*Lygocoris (Apolygus) lucorum* (M.-D.)

W: Čhönne, 10. VI. 1965, 1 ♂. L: Čöngdžu (B); Hjesan (B); Medung (B); Nungi (B); Pungsö (B); Sinyidžu (B). 36 ♂♀.

*Lygocoris (Apolygus) nigronasutus* (STÅL)

W: Dephun bei Kujang-dong, 4. IX. 1959, 1 ♀; Onpho-ri, Kreis Kjöngsöng, 11. IX. 1966, 9 ♂♂ und 9 ♀♀; 29 km südwestl. Čhöngdžin, 11. IX. 1966, 9 ♂♂ und 5 ♀♀.

*Lygocoris (Apolygus) hilaris* (HORV.)

W: Kreis Hjangsan: Tal d. Fl. Hjangsan-čhon, 18. VI. 1965, 1 ♂. L: Hudžirjông, 1 ♀ (B).

LINNAVUORI (1963) hat Recht, daß er *Cyphodema hilare* HORV. als verwandt zu *Lygocoris adustus* JAK. stellt. Es handelt sich aber um verschiedene Arten und nicht um Untertarten wie LINNAVUORI meint. Die von ihm gegebene Abbildung der Genitalien von „*L. adustus nominata* form“ bezieht sich auf *L. hilaris* (HORV.). Letztere Art hat folgende Merkmale:

Grundfarbe gelb. Stirnschwiele beim ♂ in der Regel fast ganz schwarz, beim ♀ nur distal schwarz gesäumt. 2. Fühlerglied ganz, oder nur distal und proximal schwarz. Clavus meistens ganz oder nur proximal hell. Corium proximal mehr oder weniger hell. Spicula des Aedeagus (Abb. 19A) lang und dünn, mit kleiner Basalplatte; zu gezähntem Lappen (Abb. 19B) ausgezogen; zusätzliche