

Spicula aedeagi (Abb. 33) ist viel länger als beim *L. gemellatus* und ohne apikale Verbreitung (im Gegensatz zu *L. punctatus*). Die anderen männlichen Genitalien sind an dem Abb. 27, 30 und 31 abgebildet.

*Orthops kalmi* (L.)

W: Musu-ri, Kreis Purjōng, 1. VI. 1965, 3 ♀♀.

*Orthops rubeolus* (KULIK)

L: Čaansa, 3. VII. (S), 1 ♀.

*Eurystylus* sp. prope *luteus* HSIAO

W: Pjōngjang, 28. VII. 1959, 1 ♀. L: Kapsan (B), 1 ♀.

Nach der Originalbeschreibung ist der Typus von *E. luteus* HSIAO (ein ♀ aus China) größer (Länge 6,5 mm, Breite 2,77 mm) als die untersuchten 2 ♀♀ aus Korea (Länge 5,0–5,3 mm, Breite 2,4–2,5 mm). Der Typus von *E. luteus* ist leider für uns zur Zeit unzugänglich.

*Phytocoris* (*Ktenocoris*) *nowickyi* FIEB.

W: 29 km südwestl. Čhōngdžin, 11. IX. 1966, 1 ♀. L: Hjesan (B); Jangpjang (B); Sinmusan (B), 3 ♂♂ und 1 ♀.

*Phytocoris* (s. str.) *intricatus* FL.

W: Hjangam-ri, Kreis Hjangsan, 19. VI. 1965, 1 ♀; 12 km östl. Hamhyng, 14. IX. 1966, 1 ♀; Čhōngdžin, 13. IX. 1966, 1 ♂.

*Loristes* gen. n.

Species typica: *Adelphocoris decoratus* REUTER, 1908.

Von größerer, länglicher Gestalt. Oberseite mit dichter, kurzer und anliegender goldgelber Behaarung. Kopf, Pronotum und Scutellum glänzend, Deckflügel matt.

Kopf stark geneigt (Abb. 34) von vorne gesehen etwas kürzer als breit (Abb. 35). Stirn gewölbt, Stirnkeil breit, bei Lateralansicht gut sichtbar, durch eine flache Rinne von der Stirn abgesetzt, Zügel hoch, proximal winkelig vorstehend (Abb. 34). Augen groß, das Pronotum fast berührend. Fühler kurz und anliegend behaart, 1. Glied länger als die Diatone, nur mit anliegender Behaarung (ohne lange, aufgerichtete Borsten!), 2. Glied stabförmig, gleichmäßig dick, etwa so lang wie das Pronotum hinten breit. Rostrum die Mittelcoxen erreichend. Pronotum trapezförmig, Kragen dicker als das 2. Fühlerglied, Proximalabschnitt des Pronotums fein quer gerunzelt. Scutellum konvex