

*Stenodema sibiricum* BERGR.

W: Musan-rjǒng, 60 km nördl. Čhǒngdžin, 2. VI. 1965, 2 ♀♀; am See Čangdžin-ho, 9. VI. 1965, 1 ♀; Kreis Hjangsan, Tal d. Fl. Hjangsan-čhon, 18. VI. 1965, 1 ♀. L: Jalu (K); Sinmusan (B). 5 ♂♂.

*Stenodema rubrinerve* HORV.

L: Sǒul (leg. JENJOURIST), 3 ♀♀.

*Trigonotylus ruficornis* (GEOFFR.)

L: zwischen Muduvon und Pektusan (B), 1 ♂; Pektusan (B), 1 ♀.

*Trigonotylus coelestialium* (KIRK.)

W: Pjǒngjang, 2. IX. 1959, 2 ♂♂; Dephun bei Kujang-dong, 4. IX. 1959, 2 ♀♀; Hyngsang, 11. VI. 1965, 3 ♀♀; Kreis Hjangsan, Tal d. Fl. Hjangsan-čhon, 18. VI. 1965, 2 ♂♂ und 10 ♀♀; Wǒnsan, 1. IX. 1966, 4 ♂♂ und 2 ♀♀; Onpho-ri, Kreis Kjongsǒng, 11. IX. 1966, 2 ♀♀; Čhǒngdžin, 13. IX. 1966, 8 ♂♂ und 12 ♀♀; 12 km östl. Hamhyng, 14. IX. 1966, 1 ♂ und 2 ♀♀; Thesong, Kreis Kangsǒ, 19. IX. 1966, 1 ♂; Pjǒngjang, 21. IX. 1966, 1 ♀; Kreis Hjangsan, Mjohjang-san, 23.-24. IX. 1966, 1 ♂ und 2 ♀♀. L: zwischen Sempjǒngčang-kori und Saku, 27. VI. (S); Čǒngdžu (B); Herin (B); Jangdǒk (B); Jangpjang (B); Kapsan (B); Nungi (B); Pungsǒ (B); Sinmusan (B); Teso (B). Insgesamt 55 ♂♂.

*Labops sahlbergi* (FALL.)

W: am See Čangdžin-ho, 9. VI. 1965, 1 ♀.

*Orthocephalus funestus* JAK.

W: Džamo-ri, Kreis Sunčhǒn, 27. V. 1965, 1 ♀; Jǒnpong-ri, Kreis Hongvǒn, 8. VI. 1965, 1 ♀; Kreis Hjangsan, Tal d. Fl. Hjangsan-čhon, 18. VI. 1965, 2 ♀♀; das Tal Hapiro, Kreis Hjangsan, 20. VI. 1965, 1 ♂; Hjangam-ri, Kreis Hjangsan, 21. VI. 1965, 1 ♀. L: Pal'mak, 29. VI. (S), 1 ♂.

*Halticus comitans* sp. n.

Stark glänzend, Oberseite mit hellen, langen und anliegenden Haaren. Halbdecken ohne Schuppenhaare.

Kopf etwa gleich hoch und breit, schwarz, Scheitel am Auge undeutlich schmutziggelb, selten auch die Zügel gelblich (bei den hellen Stücken aus Sǒul der ganze Kopf rötlichgelb, nur der Scheitelrand schwarz), Synthlipsis 2,5mal (♂) oder 2,7mal (♀) so breit wie der Augendurchmesser. Scheitel scharf gekielt. Stirn mit einem tiefen runden Grübchen. 1. Fühlrglied gelb, 2. Glied gelb, distal breit graubraun, 3. Glied schwarz, proximal schmal weißlich, 4. Glied schwarz; Längenverhältnis der Fühlrglieder 0,31 : 1,43 : 0,65 : 0,37 mm. Pronotum glatt und schwarz (bei den hellen Stücken aus Sǒul ist das Pronotum rötlichgelb und nur der Vorder- und der Hinterrand sind schmal schwarz), etwa 2mal