

Сем. MIRIDAE

Подсем. ORTHOTYLINAE

DIMORPHOCORIS REUT.

Род включает свыше 20 видов, распространенных в Средиземноморье, преимущественно в горных районах. Для СССР до недавнего времени был известен только 1 вид — *D. tauricus* Horv. из Крыма и Кавказа.¹ С учетом видов, рассмотренных ниже, фауна СССР возрастает до 6 видов, а ареал рода продвигается на восток от Закавказья до Алтая.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ DIMORPHOCORIS
ФАУНЫ СССР

- 1 (8). ♂♂ полнокрылые, ♀♀ короткокрылые. По крайней мере на голове, переднеспинке, а у ♀♀ и на верхней стороне брюшка есть черные волоски. На 2—4-м члениках усиков имеются волоски, длина которых больше или равна толщине членика.
- 2 (3). ♂: наружный край кориума с белыми и черными волосками; внутренняя половина надкрылий черная или темно-бурая. ♀: переднеспинка, щиток и спинная сторона брюшка целиком или почти целиком черные. — Крым, Кавказ *D. tauricus* Horv.
- 3 (2). ♂: наружный край кориума только с белыми волосками; внутренняя половина надкрылий бледно-буроватая. ♀: переднеспинка, щиток и спинная сторона брюшка целиком или почти целиком светлые, желтовато-белые.
- 4 (7). Надкрылья с черными и белыми волосками. Темя между глазами более (♂) или менее (♀) вогнутое.
- 5 (6). Внутренняя половина надкрылий с прилегающими серебристо-белыми волосками,² намного более короткими, чем черные волоски. ♂: длиннее 5.5 мм; 1-й членик усиков весь черный. ♀: надкрылья сзади более или менее закруглены, прикрывают меньше $\frac{1}{2}$ длины брюшка, их общий шов короче щитка; 2-й членик усиков длиннее ширины головы, на вершине обычно темный. — Франция, Болгария (subsp. *fuscus* Joak.), Алтай (subsp. *altaicus* Kerzh., subsp. n.) *D. fuscus* Joak.
- 6 (5). Внутренняя половина надкрылий с торчащими белыми волосками, почти такими же длинными, как черные волоски. ♂: не длиннее 5.1 мм; 1-й членик усиков сверху желтоватый. ♀: надкрылья сзади прямо срезаны, прикрывают не меньше $\frac{1}{2}$ длины брюшка, их общий шов в 1.5 раза длиннее щитка; 2-й членик усиков короче ширины головы, весь светлый. — Саратовская и Гурьевская обл., Целинный край *D. asanovae* Kerzh.
- 7 (4). Надкрылья только с белыми полуприподнятыми волосками. Темя между глазами слегка выпуклое. — Целиноградская и Карагандинская обл. *D. albipilis*, sp. n.
- 8 (1). ♂♂ и ♀♀ короткокрылые. Верхняя сторона тела без черных волосков или только на заднем крае темени и у передних углов переднеспинки несколько черных щетинок. Волоски на 2—4-м члениках усиков короче толщины этих члеников.

¹ Описанный с Сахалина *D. angustatus* Mats., 1911, по всей вероятности, не относится к роду *Dimorphocoris*; возможно, это синоним *Globiceps dispar* Boh. (♂) или какого-либо другого вида.

² Светлые волоски на надкрыльях у этого и следующего видов очень легко опадают, значительно легче черных волосков.