

Zakanocoris P u t s h k o v, gen. nov. Тіло видовжено-овальне, слабко блискуче, вкрите лише світлими короткими волосками. Голова поперечна, сильно нахилена. Очі помірно зернисті, у обох статей майже однакові (рис. 2, 1, 2). Вусики суцільно жовті, їх другий членок у самців трохи товщий, ніж у самок. Перший членок хоботка трохи заходить за передній край грудей.

Надкрила повні, однобарвні. Ноги суцільно жовті, голінки з тонкими жовтими шипиками. Другий членок задніх лапок в 1,5 раза довший за перший і ледве довший за третій. Кігтики від середини плавно зігнуті;




Рис. 2. *Zakanocoris aceri* gen. et sp. n.:

1 — самець, вигляд голови спереду; 2 — самка, те ж; 3 — кігтик лапки; 4 — едеагус, загальний вигляд; 5 — те ж, верхинна частина.

псевдоаролії маленькі, явно коротші за частину кігтика поза своєю верхиною (рис. 2, 3). Пігофор самця займає біля половини довжини черевця, злегка здавлений з боків, тупокилюватий і містить С-подібний едеагус (рис. 2, 4). Типовий вид — *Zakanocoris aceri* P u t s h k o v, sp. nova.

Новий рід за рядом ознак, особливо однобарвними кінцівками і могутнім едеагусом, близький до *Psallodema* P u t s h., але добре відрізняється жовтими шипиками голінок, короткими псевдоароліями кігтиків задніх лапок та іншими ознаками. Від роду *Icodema* відрізняється невеликими, однаковими у обох статей, очима, світлим наличником, коротшими вусиками та іншими особливостями. Місце нового роду в таблиці сліпняків Європейської частини СРСР [1] знаходиться нижче тези 232 (замість тез 233 і 234) так:

- | | | | |
|---|-----|---|---|
| 1 | (4) | Хоботок не заходить за тазики задніх ніг. | |
| 2 | (3) | Надкрила блідо-зеленкуваті, в буруватих цяточках, або задній край коріума з бурюю перев'язкою. На лободових | 98. <i>Leucopteryx</i> Reuter. |
| 3 | (2) | Надкрила однобарвно жовтуваті з жовтими жилками. На кленах (рід <i>Acer</i>) . . . | <i>Zakanocoris</i> P u t s h k o v. |
| 4 | (1) | Хоботок заходить за тазики задніх ніг | 105. <i>Megalocoleus</i> Fieb. (частина). |
- Далі йде теза 235.

Zakanocoris aceri P u t s h k o v, sp. nov. ♂. Тіло та кінцівки суцільно однобарвні, блідо-жовтуваті, черевце і груди знизу з зеленуватим відтінком. Голова коротка (рис. 2, 1); тім'я вдвоє ширше за око (15 : 7).