

(Sinneshöcker) breit, aber ihr oberer Rand eingebuchtet, distal eine längere Spitze. Rechter Paramer (Fig. 11, Mitte) gerundet, ziemlich breit, Hypophysis klein. Spitzenteil der Theca (Fig. 11, unten) kräftig, leicht gekrümmt, Ränder geschweift.

L ä n g e : ♂ = 3,1 - 3,4 mm, ♀ = 3,4 - 3,65 mm.

V e r b r e i t u n g : Bisher nur aus S y r i e n : Tartus 15. - 18.5.52 8 ♂♂, 13 ♀♀, Homs 8. - 14.5.52 2 ♂♂, Baniyas 19. - 23.5.52 1 ♂. Die Tiere lebten an einer blau blühenden Echiumart.

Ich untersuchte 11 ♂♂ und 13 ♀♀. Holotypus (Tartus) und Paratypoide in meiner Sammlung, Allotypoid und Paratypoide in der Sammlung G. SEIDENSTÜCKER in Eichstätt.

Ich widme diese Subspecies Herrn Prof. Atif Şengün, dem Redakteur dieser Zeitschrift, der sich durch entgegenkommende Hilfe bei meinen Arbeiten grosse Verdienste um die Heteropteren der Türkei erworben hat.

#### 6. *Psallus seidenstückeri* nov. spec.

F ä r b u n g : Grundfarbe schwarz, hellere Stücke lagen nicht vor. Kopf einfarbig schwarz. Fühler schwarz oder schwarzbraun, 2. Glied nie aufgeheilt, auch das 3. und 4. stets dunkel. Halbdecken einfarbig schwarz, ebenso die Unterseite. Schenkel schwarzrot, seltener fast schwarz, Schienen einfarbig schwarz.

W i c h t i g s t e K e n n z e i c h e n : Gestalt (Fig. 18) klein. das ♀ auffallend viel kleiner als das ♂, das ♀ 3,0 ×, das ♂ 2,7 × so lang wie das Pronotum breit ist. Scheitel beim ♂ 1,7 ×, beim ♀ 2,15 × so breit wie das Auge. 2. Fühlerglied beim ♂ 1,25 ×, beim ♀ 1,07 × so lang wie der Kopf breit ist und beim ♂ 1,46 ×, beim ♀ 1,33 × so lang wie das 3. Das Rostrum erreicht die Spitze der Hinterhüften. 3. Glied der Hintertarsen beim ♂ 1,1 ×, beim ♀ 1,15 × so lang wie das 2. Klauen (Fig. 24) klein, dick, stark gekrümmt, Haftlappchen kurz und breit. Vesica des Penis (Fig. 6) auffallend lang und schlank, leicht gekrümmt, der Spitzenteil liegt in gleicher Richtung wie der basale Teil, ist kurz, sehr schlank und trägt an der Innenkante lange, anliegende Zähne; sekundäre Gonopore der Spitze sehr nahe, neben ihr keine Chitinspitze. Linker Paramer (Fig. 12, oben) mit schmaler, distal gerundeter linker Seite (Sinneshöcker), deren oberer Rand geschweift und die distal eine kurze, gekrümmte Spitze trägt. Rechter Paramer (Fig. 12, Mitte) sehr schlank, mit langer, schlanker Hypophysis. Spitzenteil der Theca (Fig. 12, unten) gerade, stark verjüngt.

L ä n g e : ♂ = 3,4 - 3,8 mm, ♀ = 2,8 - 3,4 mm.

V e r b r e i t u n g : Bisher nur aus der T ü r k e i : Antakya 4. - 8.6.52 9 ♂♂, 6 ♀♀, ein einzelnes ♂ auch aus S y r i e n : Tartus 15. - 18.5.52, sämtlich G. SEIDENSTÜCKER leg.

Ich untersuchte 10 ♂♂ und 6 ♀♀. Holotypus (Antakya) und Paratypoide in meiner Sammlung, Allotypoid und Paratypoide in der Sammlung G. SEIDENSTÜCKER in Eichstätt.