

## Das bisher unbekannte Männchen von *Atractotomus schmiedeknechti* Reuter, 1899 (Heteroptera, Miridae)

Eduard Wagner

(Moorreye 103, D-2000 Hamburg 62)

### Abstract

The hitherto unknown male of *Atractotomus schmiedeknechti* Reuter, 1899 is described and the species is transferred to the genus *Heterocapillus* E. Wagner.

Die Art wurde 1899 von REUTER beschrieben. Ihm lag nur das ♀ vor, das er von Fokker erhalten hatte. Es scheint sich jedoch um mehrere Exemplare gehandelt zu haben, da REUTER 2 Fundorte in der Beschreibung angibt. Gesammelt wurden die Tiere von Schmiedeknecht. Als Fundorte werden Oran und Tlemcen in Algerien angegeben. Seither hat niemand etwas über die Art publiziert, nur OSHANIN führt sie in seinem Katalog an.

Jetzt liegt mir ein ♂ der Art aus Marokko vor, das von Pardo bei Ketama im Juli 1972 gefunden wurde. Der Verfasser erhielt das Tier von Herrn Dr. J. Ribes, Barcelona, dem Pardo die Hemiptera seiner Ausbeute zur Verfügung gestellt hatte. Da das ♂ der Art bisher nicht beschrieben wurde, möge hier eine Beschreibung dieses Tieres folgen.

Gestalt (Fig. 1a) lang-oval,  $3 \times$  so lang wie die Pronotumbreite. Schwarz, nur die Beine zum Teil hell. Die Behaarung lässt sich nicht einwandfrei ermitteln. Auf der Oberseite fanden sich Spuren einer hellen Behaarung. Das passt insofern zu der Beschreibung des ♀ durch Reuter, als er nur auf der Unterseite helle Schuppenhaare entdecken konnte und vermutet, dass die Oberseite abgerieben war.

Kopf geneigt,  $0,72 \times$  so breit wie das Pronotum (Fig. 1c). Scheitel  $1,7 \times$  so breit wie das Auge, sein Hinterrand un- deutlich gekielt. Kopf unter den Augen nur kurz (Fig. 1b). Tylus stumpf. Fühlerwurzel nahe der unteren Au-




Fig. 1. *Heterocapillus schmiedeknechti* (Reuter) ♂. a = Gestalt, b = Kopf von vorn, c = Kopf und Pronotum von oben, d = Fühler, e = Hinterfuss, f = rechtes Paramer von oben, g = linkes Paramer von oben, h = Vesika von rechts, i = Apikalteil der Theka von rechts.