

***Macrotylus (Macrotylus) bernadettæ* n. sp. décrite de Grèce (Heteroptera, Miridae)**

par Armand MATOCQ

9 avenue Léon Blum, F - 93800 Epinay-sur-Seine

Résumé. - L'auteur décrit une nouvelle espèce grecque de *Macrotylus*.

Summary. - The author describes a new specie of *Macrotylus* of Greece.

Mots clés. - Heteroptera, Miridae, *Macrotylus bernadettæ* n. sp., Grèce.

Le genre *Macrotylus* compte une quarantaine d'espèces paléarctiques de taille variable (3 à 6 mm) et de forme générale plutôt oblongue. Deux caractères permettent de séparer sûrement ce genre de la sous-famille des Phylinae : le tylus très saillant, bien séparé du front ; les ongles fortement courbés sur toute leur longueur à peine plus longs que l'épaisseur du tarse et comportant une dent basale bien visible.

Les clés de détermination usuelles permettent de distinguer dans ce genre deux groupes d'espèces d'après leur coloration. Le premier groupe possède une face dorsale de couleur foncièrement noire, le second groupe possède une face dorsale en grande partie claire de teinte jaunâtre, verdâtre ou grisâtre (STICHEL, 1956-1958, WAGNER & WEBER, 1964, WAGNER, 1970-1978).

Sept espèces, énumérées ci-dessous dans l'ordre chronologique de leur description, composent actuellement le premier groupe, lui-même scindé en deux sous-genres.

- 1^{er} sous-genre, nominatif, (*Macrotylus*) Fieber, 1858 : *Macrotylus (Macrotylus) quadrilineatus* (Schrank, 1785) ; *M. (M.) lindbergi* E. Wagner, 1953 ; *M. (M.) seidenstückeri* E. Wagner, 1954 ; *M. (M.) soosi* Josifov 1962 ; *M. (M.) scutellaris* E. Wagner, 1966 ; *M. (M.) phlomidis* Rieger, 1984 ;
- 2nd sous-genre (*Pontodemus*) E. Wagner, 1969 : *Macrotylus (Pontodemus) ponticus* Seidenstücker, 1967.

La nouvelle espèce décrite appartient au premier sous-genre du premier groupe.

Tous les mâles de ce sous-genre possèdent une vesica de forme complexe et très caractéristique. Cette particularité permet une détermination aisée en utilisant les ouvrages de faunistique classiques (WAGNER & WEBER, WAGNER, *op. cit.*). Il est toutefois plus judicieux d'utiliser la publication de SEIDENSTÜCKER (1967) pour déterminer *Macrotylus quadrilineatus* mâle ou femelle.

***Macrotylus (Macrotylus) bernadettæ* n. sp.**

La description de cette espèce est faite à partir de l'examen de 111 spécimens : 27 ♂, 38 ♀, dont l'HOLOTYPE ♂, capturés en Grèce, dans le Péloponnèse, région du Magne, en bord de mer, sur *Salvia* sp., aux alentours de la bourgade de Marmari, 2.V.1994 (*J. Péricart, Ph. Magnien & A. Matocq leg.*) ; 5 ♂, 16 ♀, 4.V.1995 (*Ph. Magnien leg.*) ; 3 ♂, 17 ♀, même région et mêmes conditions, à Kotronas, 3.V.1994 (*J. Péricart, Ph. Magnien & A. Matocq leg.*) ; 3 ♂, 2 ♀, à Monemvassia, 3.V.1995 (*Ph. Magnien leg.*) sur une plante basse indéterminée.